

## Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **SEGREN** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

## Fórmula

Cada cápsula contiene:

Fenofibrato 200 mg. Excipientes: estearato de magnesio, almidón pregelatinizado, povidona K30, crospovidona, lauril sulfato de sodio, almidón glicolato de sodio, almidón de maíz.

## ¿Qué es SEGREN y para qué se usa?

**SEGREN** es un medicamento que contiene Fenofibrato que pertenece al grupo de fármacos conocidos como fibratos, que se usa para reducir el nivel de un tipo de grasas (lípidos) en la sangre llamados triglicéridos y para aumentar el colesterol “bueno” (HDL colesterol) en la sangre. Está indicado para el tratamiento de: a) hiperlipoproteinemias primarias del adulto, especialmente tipo IIa, IIb, IV y V. b) hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia secundaria, cuando una dieta hipograsa estricta no sea suficiente para controlarlas.

## Antes de usar SEGREN

### No use SEGREN

- Si es alérgico al Fenofibrato o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Si padece fotosensibilidad (reacción alérgica provocada por la exposición a la luz solar o a los rayos ultravioletas) o reacciones fototóxicas durante el tratamiento con fibratos (medicamentos que modifican los niveles de lípidos) o ketoprofeno (un medicamento antiinflamatorio).
- Si padece trastornos renales severos.
- Si padece alguna enfermedad del hígado o la vesícula biliar.
- Si padece pancreatitis (inflamación del páncreas, lo que produce dolor abdominal).

### Tenga especial cuidado con SEGREN

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar Fenofibrato:

- Si tiene más de 70 años.
- Si padece o tiene algún pariente que padezca o haya padecido enfermedad muscular.
- Si padece enfermedades renales o insuficiencia renal.
- Si tiene una glándula tiroidea con baja actividad (hipotiroidismo).
- Si toma grandes cantidades de alcohol
- Si ya está tomando algún otro fibrato o una estatina (otro tipo de medicamento para modificar los niveles de lípidos) o si está tomando anticonceptivos orales (“la píldora”).

Estos factores pueden suponerle un riesgo aumentado de padecer problemas musculares durante el tratamiento con Fenofibrato. **Debe contactar con su médico inmediatamente si experimenta dolor muscular inesperado, hipersensibilidad o debilidad muscular. Esto es debido a que en algunos casos raros los problemas musculares por Fenofibrato pueden ser serios.**

Su médico puede pedirle análisis de sangre regulares para monitorizar la función de su hígado y riñón

### ***Toma simultánea de otros medicamentos***

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

Especialmente, informe a su médico o farmacéutico si está utilizando alguno de los medicamentos siguientes:

- Anticoagulantes para diluir la sangre (por ej: warfarina): el riesgo de sangrado puede aumentar.
- Ciclosporina, un inmunosupresor: puede afectar su función renal.
- Estatinas o fibratos, que son otros medicamentos que modifican los niveles de lípidos: el riesgo de problemas musculares puede aumentar.
- Perhexilina (vasodilatador coronario utilizado para el tratamiento de la angina de esfuerzo) debido a la posibilidad de desarrollar hepatitis aguda.

### **¿Cómo usar SEGREN?**

Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico. Ante cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico.

La dosis habitual es de 1 cápsula por día, preferentemente junto con una de las comidas principales. En pacientes con insuficiencia renal severa, se deberá utilizar la menor dosis posible

### ***Embarazo y lactancia***

No se aconseja el uso de Fenofibrato durante la gestación y lactancia.

### ***Uso en Pediatría***

SEGREN está contraindicado en niños.

### **Uso apropiado del medicamento SEGREN**

#### ***Si se olvidó de tomar SEGREN***

SEGREN debe tomarse preferentemente junto con una de las comidas principales. Si usted olvidó una dosis, tome la dosis que dejó de tomar tan pronto como se acuerde. No tome una dosis doble para compensar la dosis que dejó de tomar.

### **A tener en cuenta mientras toma SEGREN**

#### ***Efectos indeseables (adversos)***

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Deje de tomar Fenofibrato y acuda a su médico inmediatamente, si usted nota cualquiera de los siguientes efectos adversos graves que pueden necesitar tratamiento médico urgente:

- Reacción alérgica: los signos pueden incluir hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, que puede causar dificultad para respirar.
- Calambres o dolor, sensibilidad o debilidad muscular: éstos pueden ser signos de inflamación o ruptura muscular, que puede causar daño a los riñones o incluso la muerte.
- Dolor de estómago: esto puede ser una señal de que el páncreas está inflamado (pancreatitis);
- Dolor en el pecho y sensación de falta de aliento: éstos pueden ser signos de un coágulo de sangre en los pulmones (embolia pulmonar).
- Dolor, enrojecimiento o hinchazón en las piernas: éstos pueden ser signos de un coágulo de sangre en la pierna (trombosis venosa profunda).

- Coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos (ictericia), o un aumento de las enzimas hepáticas: éstos pueden ser signos de una inflamación del hígado (hepatitis).

Deje de tomar Fenofibrato y acuda a su médico inmediatamente, si usted nota alguno de los efectos adversos mencionados anteriormente.

Otros efectos adversos incluyen:

Frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 10 personas):

- Diarrea.
- Dolor de estómago.
- Gases (flatulencia).
- Sensación de malestar (nauseas).
- Malestar (vómitos).
- Niveles elevados de enzimas hepáticas en la sangre.

Poco frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 100 personas):

dolor de cabeza.

- Cálculos biliares.
- Disminución del deseo sexual.
- Reacciones como erupción cutánea, picor, ronchas en la piel.
- Aumento de creatinina (sustancia excretada por los riñones).
- Pancreatitis (inflamación de páncreas que produce dolor abdominal).
- Tromboembolismo: embolia pulmonar (coágulo de sangre en el pulmón que produce dolor en el pecho y dificultad para respirar), trombosis de venas profundas (coágulo de sangre en la pierna que produce dolor, rojez o inflamación).
- Dolor muscular, inflamación muscular, calambres musculares y debilidad.

Raras (afectan a menos de 1 de cada 1.000 personas):

- Pérdida de pelo.
- Sensación de mareo (vértigo).
- Sensación de agotamiento (fatiga).
- Aumento de urea (producida por los riñones).
- Aumento de la sensibilidad de la piel a la luz solar, lámparas solares y camas solares.
- Descenso en la hemoglobina (que transporta oxígeno en sangre) y descenso de leucocitos (visto en análisis de sangre).
- Hepatitis (inflamación del hígado), síntomas de leve ictericia (se amarillea la piel y el blanco de los ojos), dolor de estómago y picor.
- Hipersensibilidad (reacción alérgica).

Frecuencia no conocida (no pueden estimarse a partir de los datos disponibles):

- Problemas pulmonares a largo plazo.
- Desgaste muscular.
- Complicaciones de los cálculos biliares.

Si usted sufre cualquier molestia respiratoria inusual, informe a su médico inmediatamente.

### ¿Cómo conservar **SEGRE**N?

- Conservar en su envase original a temperatura ambiente entre 15°C y 30 °C. Preservar de la humedad.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

***Si Ud. toma dosis mayores de SEGREN de las que debiera***

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

**Esta especialidad medicinal está libre de gluten.**



**Presentaciones**

Envases con 30 cápsulas.

**Fecha de última revisión:** Agosto de 2019.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.  
No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar  
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT  
<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a  
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 55.015

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**