

# DILCORAN® PLUS D



VALSARTAN 160 mg - AMLODIPINA 5mg-  
HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 mg;  
VALSARTAN, 160 mg - AMLODIPINA 10 mg -  
HIDROCLOROTIAZIDA 12,50 mg;  
VALSARTAN, 320 mg - AMLODIPINA 10 mg -  
HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg;  
INFORMACION PARA EL PACIENTE  
CONSULTE A SU MEDICO

Comprimidos recubiertos

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **DILCORAN PLUS D** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

## FÓRMULAS

### **DILCORAN PLUS D 160 mg - 5 mg - 12,5 mg**

Cada comprimido recubierto de contiene:

Valsartan 160,000 mg; Amlodipina (como Besilato) 5,000 mg; Hidroclorotiazida 12,500 mg. Excipientes: celulosa microcristalina; hidroxipropilcelulosa; croscarmelosa sódica; crospovidona; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; propilenglicol; povidona K30; polietilenglicol 6000; dióxido de titanio; talco.

### **DILCORAN PLUS D 160 mg - 10 mg - 12,5 mg**

Cada comprimido recubierto de contiene:

Valsartan 160,000 mg; Amlodipina (como Besilato) 10,000 mg; Hidroclorotiazida 12,500 mg. Excipientes: celulosa microcristalina; hidroxipropilcelulosa; croscarmelosa sódica; crospovidona; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; propilenglicol; povidona K30; polietilenglicol 6000; dióxido de titanio; talco; óxido de hierro amarillo.

### **DILCORAN PLUS D 320 mg - 10 mg - 25 mg**

Cada comprimido recubierto de contiene:

Valsartan 320,000 mg; Amlodipina (como Besilato) 10,000 mg; Hidroclorotiazida 25,000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina; hidroxipropilcelulosa; croscarmelosa sódica; crospovidona; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; propilenglicol; povidona K30; polietilenglicol 6000; dióxido de titanio; talco; óxido de hierro amarillo.

## **¿Qué es DILCORAN PLUS D y para qué se usa?**

Su medicamento se denomina DILCORAN PLUS D y está disponible en comprimidos recubiertos. DILCORAN PLUS D contiene 3 medicamentos: amlodipina, medicamento que pertenece a la familia de los antagonistas del calcio; valsartán, que pertenece a la familia de los llamados antagonistas del receptor de angiotensina II e hidroclorotiazida, diurético perteneciente a las sulfonamidas. Los 3 medicamentos contribuyen en distintas formas a controlar la hipertensión arterial.

DILCORAN PLUS D se utiliza para tratar la hipertensión arterial en pacientes cuya presión arterial no es controlada en forma adecuada con una combinación de 2 fármacos reductores de presión arterial, o en pacientes con fármacos antihipertensivos separados que desean tomar 1 solo comprimido con los 3 componentes.

Si la hipertensión arterial continúa durante un tiempo prolongado, puede dañar los vasos sanguíneos del cerebro, corazón y riñones, lo que puede causar un accidente vascular, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o daño a la retina. La hipertensión arterial aumenta el riesgo de ataques cardíacos. La reducción de la presión arterial hasta un nivel normal disminuye el riesgo de desarrollar estos trastornos.

### **¿Cómo actúa DILCORAN PLUS D?**

DILCORAN PLUS D contiene 3 medicamentos: amlodipina, bloquea los canales de calcio a nivel de vasos sanguíneos. Esto tiene un efecto relajante sobre los vasos sanguíneos. Valsartán actúa bloqueando el efecto de la angiotensina II. La angiotensina II es una sustancia producida por el organismo que causa el estrechamiento de los vasos sanguíneos, lo que incrementa la presión arterial. Hidroclorotiazida reduce la cantidad de sal y agua en el organismo al aumentar el flujo de orina. Como resultado de estos 3 mecanismos, los vasos sanguíneos se relajan y la presión arterial disminuye.

Si Ud. tiene alguna pregunta acerca de cómo actúa DILCORAN PLUS D o por qué este medicamento le fue prescrito, por favor consulte a su médico.

### **Antes de usar DILCORAN PLUS D**

Siga atentamente todas las indicaciones de su médico. Pueden diferir de la información general contenida en este prospecto.

Es posible que su médico quiera evaluar su sangre antes y a intervalos regulares durante su tratamiento para determinar los valores de potasio, magnesio, calcio, sodio, azúcar, colesterol, ácido úrico y la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es posible que su médico también revise su función renal.

### **No use DILCORAN PLUS D**

- Si es alérgico (hipersensible) a amlodipina, valsartán, hidroclorotiazida o sulfonamidas o alguno de los otros ingredientes de DILCORAN PLUS D incluidos en este prospecto.
- Si está embarazada o piensa quedar embarazada.
- Si no puede producir orina (anuria).
- Si tiene alto nivel de azúcar en sangre y padece de diabetes tipo 2 (también llamada diabetes mellitus no insulino dependiente), mientras que usted está tomando un medicamento para bajar la presión arterial llamado aliskiren.

Si se encuentra en alguno de estos casos, avise a su médico sin tomar DILCORAN PLUS D.

Si piensa que puede ser alérgico, consulte con su médico.

### **Tenga especial cuidado con DILCORAN PLUS D**

- Si padece problemas renales o hepáticos,
- Si ya está tomando algún diurético (medicamento que aumenta la cantidad de orina producida),
- Si tiene fiebre, sarpullido facial y dolor articular, que pueden ser signos de lupus eritematoso (o historia de esta enfermedad),
- Si tiene diabetes (nivel elevado de azúcar en la sangre),
- Si le han informado que tiene un nivel elevado de colesterol o de triglicéridos en la sangre,
- Si le han informado que tiene bajos niveles de potasio o magnesio en la sangre (con o sin síntomas como debilidad muscular, espasmos musculares, ritmo cardíaco anormal),
- Si su médico le ha dicho que tiene niveles bajos de sodio en la sangre (con o sin síntomas como cansancio, confusión, espasmos musculares, convulsiones),

- Si le han informado que tiene un nivel elevado de calcio en la sangre (con o sin síntomas como náuseas, vómitos, constipación, dolor estomacal, micción frecuente, sed, debilidad y espasmos musculares),
- Si el médico le ha dicho que tiene niveles elevados de ácido úrico en la sangre,
- Si padece alergia o asma,
- Si tiene un daño en la función renal o estrechamiento o bloqueo de las arterias que suministran sangre a los riñones,
- Si sufre de episodios severos de vómito o diarrea,
- Si está tomando otros medicamentos o sustancias que incrementan los niveles de potasio en la sangre (como ciertos tipos de diuréticos, suplementos de potasio, etc.),
- Si se encuentra en período de lactancia,
- Si su médico ha diagnosticado que sufre de un estrechamiento de las válvulas cardíacas (denominada estenosis aórtica o mitral) o bien un incremento anormal del espesor del músculo cardíaco con estrechamiento (denominada cardiomiopatía hipertrófica obstructiva),
- Si alguna vez ha tenido una hinchazón, principalmente de la cara y la garganta mientras estuvo tomando otros medicamentos (incluyendo un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina IECA). Si tiene estos síntomas, deje de tomar DILCORAN PLUS D y póngase en contacto con su médico inmediatamente. Usted nunca más debe volver a tomar DILCORAN PLUS D,
- Si usted padece insuficiencia cardíaca o ha sufrido un ataque al corazón. Siga con cuidado las instrucciones de su médico para la dosis inicial. Su médico también puede evaluar la función renal.
- Si usted está siendo tratado con un IECA o aliskiren.
- Si usted padece de cáncer de piel o si desarrolla una lesión en la piel inesperada durante el tratamiento. El tratamiento a largo plazo con hidroclorotiazida puede incrementar el riesgo de cáncer de piel no melanoma, probablemente aumentando la sensibilidad de la piel a la radiación UV. Proteja su piel de la exposición solar excesiva mientras está tomando DILCORAN PLUS D. Controle su piel regularmente por cualquier nueva lesión y llame a su médico a la brevedad ante cualquier lesión cutánea sospechosa.

Si se encuentra en alguno de estos casos, avise a su médico antes de tomar DILCORAN PLUS D.

- Si experimenta mareo y/o desmayo durante el tratamiento con DILCORAN PLUS D
- Si experimenta disminución de la visión o dolor ocular. Podrían ser síntomas de un aumento de la presión en los ojos y pueden ocurrir después de horas o semanas tomando DILCORAN PLUS D. Si no es tratado, puede derivar en un daño permanente a la visión.

Si tiene alguno de estos síntomas, avise a su médico a la brevedad.

#### ***Toma simultánea de otros medicamentos***

Dígale a su médico o farmacéutico si toma o ha tomado recientemente algún otro medicamento, incluyendo los que ha comprado sin receta.

Esto incluye en particular:

- Medicamentos ahorradores de potasio, suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contienen potasio u otras drogas que puedan aumentar los niveles de potasio. Su médico debe chequear su nivel de potasio en sangre periódicamente.
- Anfotericina, penicilina G (medicamentos usados para tratar infecciones).
- Carbenoxolona (un medicamento usado para tratar la inflamación y ulceración esofágica).
- Otros medicamentos usados para bajar la presión arterial; especialmente IECA o aliskiren.

- Litio, antidepresivos, antipsicóticos, medicamentos utilizados para tratar algunas afecciones psicológicas.
- Antiepilépticos, como la carbamazepina (medicamentos utilizados para tratar las convulsiones).
- Medicamentos usados para aliviar el dolor o la inflamación, especialmente antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), incluidos los Inhibidores Selectivos de la Ciclooxygenasa-2 (Inhibidores de la COX-2); es posible que su médico también revise su función renal.
- Medicamentos similares a la cortisona, esteroides.
- Antiarrítmicos (medicamentos usados para tratar problemas cardíacos).
- Digoxina u otros glucósidos de la digital (medicamentos usados para tratar problemas cardíacos).
- Relajantes musculares (medicamentos usados durante operaciones).
- Alopurinol (medicamento usado para el tratamiento de la gota).
- Amantadina (medicamento utilizado para el tratamiento del Parkinson, utilizado además para prevenir ciertas enfermedades virales).
- Ciertos medicamentos contra el cáncer.
- Agentes anticolinérgicos (medicamentos usados para tratar diversos trastornos, como contracciones gastrointestinales, espasmos de la vejiga urinaria, asma, mareo por movimiento, espasmos musculares, enfermedad de Parkinson y como auxiliar en la anestesia).
- Ciclosporina (medicamento utilizado en trasplante para prevenir el rechazo del órgano o para otras afecciones, por ejemplo: Artritis reumatoide o dermatitis atópica).
- Insulina o antidiabéticos orales (medicamentos usados para tratar los niveles elevados de azúcar en sangre).
- Colestiramina, colestipol u otras resinas (medicamentos utilizados principalmente para tratar niveles elevados de lípidos en la sangre).
- Vitamina D y sales de calcio.
- Aminas presoras como la noradrenalina (medicamentos que elevan la presión arterial).
- Barbitúricos, narcóticos (medicamentos con propiedades inductoras de sueño) y alcohol.

Informe a su médico o farmacéutico si Ud. está tomando o ha tomado recientemente algún otro medicamento que puede alterar la cantidad de amlodipina en su cuerpo, en particular:

- Medicamentos utilizados para tratar y/o prevenir infecciones fúngicas en la piel (tales como ketoconazol, itraconazol).
- Medicamentos utilizados para el tratamiento del SIDA o infecciones con HIV (tales como ritonavir, indinavir).
- Medicamentos empleados para el tratamiento de infecciones por bacterias (tales como claritromicina, telitromicina, rifampicina).
- Simvastatina (medicamento indicado para controlar los niveles elevados de colesterol).
- Medicamentos utilizados para tratar la depresión (como la hierba de San Juan, Hypericum perforatum).

Informe a su médico o farmacéutico si Ud. está tomando o ha tomado recientemente algún otro medicamento que puede cambiar la cantidad de valsartán en su cuerpo, especialmente:

- Algunos antibióticos (familia de la rifampicina), medicamentos utilizados para evitar el rechazo del órgano trasplantado (ciclosporina) o medicamentos antirretrovirales utilizados para el tratamiento de la infección con HIV/SIDA (ritonavir). Estos medicamentos pueden aumentar el efecto de valsartán.

#### **¿Cómo usar DILCORAN PLUS D?**

Siga atentamente las instrucciones de su médico. No exceda la dosis recomendada.  
DILCORAN PLUS D sólo es para uso oral.

#### **¿Cuánto DILCORAN PLUS D tomar?**

Su médico le dirá exactamente la cantidad de comprimidos de DILCORAN PLUS D que debe tomar.  
Dependiendo de su respuesta al tratamiento, su médico podría sugerir una dosis mayor o menor.  
La dosis recomendada de DILCORAN PLUS D es 1 comprimido recubierto al día.

#### **¿Cuándo tomar DILCORAN PLUS D?**

Tome DILCORAN PLUS D a la misma hora todos los días, lo que ayudará a que recuerde cuándo tomar su medicamento.

#### **¿Cómo tomar DILCORAN PLUS D?**

DILCORAN PLUS D se puede tomar con o sin alimentos. Trague los comprimidos con un vaso de agua.

#### **¿Cuánto tiempo tomar DILCORAN PLUS D?**

Continúe tomando DILCORAN PLUS D mientras su médico se lo indique.  
Si tiene consultas respecto a cuánto tiempo tomar DILCORAN PLUS D, consulte con su médico o farmacéutico.

#### **Si toma más DILCORAN PLUS D del indicado**

Si toma accidentalmente demasiados comprimidos de DILCORAN PLUS D, avise a su médico de inmediato.

#### ***Embarazo y lactancia***

No tome DILCORAN PLUS D si está embarazada o planea quedar embarazada. El uso durante el embarazo puede causar un daño severo al niño en gestación. Es importante ver al médico de inmediato si piensa que puede haber quedado embarazada o planifica quedar embarazada.  
Su médico comentará con usted los posibles riesgos de tomar DILCORAN PLUS D durante el embarazo.  
Avisé a su médico si se encuentra en período de lactancia. No se recomienda el tratamiento con DILCORAN PLUS D durante la lactancia.

#### ***Uso en niños***

El uso de DILCORAN PLUS D en niños y adolescentes no está recomendado.

#### ***Uso en ancianos***

No existen recomendaciones especiales de dosificación para pacientes mayores de 65 años. Su médico decidirá si DILCORAN PLUS D es correcto para usted.

#### ***Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos***

Tenga presente que DILCORAN PLUS D puede ocasionar mareos o cansancio. Tenga cuidado a la hora de conducir vehículos o utilizar maquinarias si presenta estos efectos.

#### ***Toma conjunta de DILCORAN PLUS D con alimentos y bebidas***

Puede tomar DILCORAN PLUS D con o sin alimentos.

#### **Uso apropiado del medicamento DILCORAN PLUS D**

#### ***Si se olvidó de tomar DILCORAN PLUS D***

Es recomendable tomar el medicamento a la misma hora cada día, de preferencia en la mañana. Si olvida tomar DILCORAN PLUS D, hágalo apenas lo recuerde y luego tome la dosis siguiente a la hora habitual. Sin embargo, si está muy próxima la hora de la dosis siguiente, saltee la dosis que olvidó. No tome una dosis doble para compensar el comprimido olvidado.

#### ***Si suspende el uso de DILCORAN PLUS D***

La suspensión de su tratamiento con DILCORAN PLUS D podría causar el agravamiento de la enfermedad. No suspenda la toma de su medicamento, a menos que se lo indique su médico.

#### **A tener en cuenta mientras toma DILCORAN PLUS D**

##### ***Efectos indeseables (adversos)***

Como todos los medicamentos, los pacientes tratados con DILCORAN PLUS D pueden experimentar efectos secundarios, aunque no afecten a todas las personas.

##### Amlodipina

Algunos efectos adversos pueden ser serios. Si Ud. experimenta:

- Erupción cutánea con o sin dificultades en la respiración (posibles signos de reacciones alérgicas),
- Sangrado espontáneo o hematomas (posible síntoma de trombocitopenia);
- Fiebre, dolor de garganta o úlceras en la boca debido a infecciones (posible síntoma de leucocitopenia);
- Sensación de entumecimiento u hormigueo en los dedos de manos y pies (posible síntoma de neuropatía periférica);
- Latidos irregulares del corazón (posible síntoma de fibrilación auricular);
- Latido lento del corazón (posible síntoma de bradicardia);
- Dolor en el pecho repentino y opresivo (posible síntoma de infarto de miocardio);
- Erupción, manchas rojo-púrpura, fiebre, picazón (posible síntoma de vasculitis);
- Dolor agudo a la altura de la boca del estómago (posible síntoma de pancreatitis);
- Piel y ojos amarillentos, náuseas, pérdida del apetito, orina de color oscuro (posible síntoma de hepatitis);
- Hinchazón principalmente de la cara y la garganta (posible síntoma de angioedema);
- Erupción, enrojecimiento de la piel, ampollas en los labios, ojos o boca, descamación de la piel (posible síntoma de eritema multiforme);
- Erupción, enrojecimiento de la piel, formación de ampollas en los labios, ojos o boca, descamación de la piel, fiebre (posibles síntomas de Síndrome de Steven-Johnson).

Si Ud. padece alguno de estos efectos, comuníquelo a su médico de inmediato.

##### Algunos efectos adversos son frecuentes (afectan como mucho a 1 de cada 10 en 100 pacientes):

- Palpitaciones.
- Sofocación (rubor).
- Dolor abdominal.
- Náuseas.
- Hinchazón (edema).
- Cansancio (fatiga).

##### Algunos efectos adversos son poco frecuentes (afectan como mucho a 1 de cada 10 en 1000 pacientes):

- Insomnio.

- Cambios de humor incluyendo ansiedad.
- Temblores (tremor),
- Disminución de la sensibilidad en la piel (hipoestesia),
- Alteraciones en el sentido del gusto (disgeusia),
- Hormigueo o entumecimiento (parestesia),
- Pérdida súbita de la conciencia (síncope)
- Trastornos visuales (deterioro visual)
- Visión doble (diplopía)
- Ruidos en los oídos, zumbidos (tinnitus)
- Mareos, desvanecimiento (hipotensión)
- Dificultad para respirar, disnea.
- Flujo o congestión nasal, estornudos (rinitis).
- Vómitos.
- Molestias en el estómago después de las comidas (dispepsia).
- Sequedad bucal.
- Constipación.
- Diarrea.
- Caída del cabello (alopecia).
- Sudor excesivo (hiperhidrosis).
- Picazón (prurito).
- Erupción.
- Manchas en la piel de color púrpura (púrpura).
- Decoloración de la piel.
- Aumento de la sensibilidad de la piel al sol (fotosensibilidad).
- Dolor de espalda.
- Espasmos musculares.
- Dolor muscular (mialgia).
- Dolor en las articulaciones (artralgia).
- Trastornos en la micción.
- Necesidad de levantarse a la noche para orinar (nicturia).
- Necesidad frecuente de orinar (poliuria)
- Aumento de las mamas en los hombres (ginecomastia).
- Incapacidad de lograr o mantener una erección (disfunción eréctil).
- Debilidad (astenia).
- Dolor.
- Sensación de malestar general (malestar general).
- Dolor de pecho.
- Aumento de peso.
- Pérdida de peso.

Algunos efectos adversos son muy raros (afectan como mucho a 1 de cada 10000 pacientes):

- Altos niveles de azúcar en sangre (hiperglucemia).
- Pobre control de los movimientos (hipertonía).
- Latidos irregulares del corazón (arritmia).
- Pulso cardíaco rápido (taquicardia ventricular).
- Tos.
- Dolor de estómago, náuseas (gastritis).

- Sangrado, agrandamiento o sensibilidad de las encías (hiperplasia gingival).
- Ojos y piel amarillentos (ictericia).
- Aumento de las enzimas hepáticas (mayormente consistente con colestasis).
- Si alguno de éstos afecta a Ud. severamente, dígaselo a su médico.

#### Valsartán

Algunos efectos adversos pueden ser serios (frecuencia desconocida: frecuencia que no puede ser estimada desde la información disponible):

Ud. puede experimentar síntomas de angioedema (una reacción alérgica), tales como:

- Hinchazón de la cara, lengua o garganta.
- Dificultad para tragar.
- Urticaria y dificultad para respirar.

Si Ud. padece alguno de estos efectos, comuníquelo a su médico de inmediato.

#### Algunos efectos adversos son poco frecuentes (afectan como mucho a 1 de cada 10 en 1000 pacientes):

- Sensación de giros (vértigo).
- Tos.
- Dolor abdominal.
- Cansancio.

#### También se reportó (frecuencia desconocida: frecuencia que no puede ser estimada desde la información disponible)

- Reacción alérgica con síntomas como erupción cutánea, picazón, mareos, inflamación de la cara o los labios o la lengua o garganta, dificultad para respirar o tragar (los posibles síntomas de angioedema) - (ver también "Algunos efectos secundarios pueden ser graves" en la lista anterior).
- Disminución de la función renal (posibles síntomas de la insuficiencia renal) y disminución severa del ritmo diurético (posibles síntomas de la insuficiencia renal aguda).
- Ampollas en la piel (signo de dermatitis bullosa).
- Erupción cutánea, picazón, junto con algunos de los siguientes signos o síntomas: fiebre, dolor en las articulaciones, dolor muscular, inflamación de los ganglios linfáticos y/o similares a la gripe (posibles síntomas de la enfermedad del suero).
- Manchas rojo-púrpura, fiebre, picazón (posibles síntomas de inflamación de los vasos sanguíneos, también llamada vasculitis).
- Sangrado o hematomas inusuales (posibles síntomas de la trombocitopenia).
- Dolor muscular (mialgia).
- Fiebre, dolor de garganta o úlceras en la boca debido a infecciones (posibles síntomas de bajo nivel de glóbulos blancos también llamado neutropenia).
- Disminución del nivel de hemoglobina y del porcentaje de glóbulos rojos en la sangre (que puede, en casos severos, llevar a la anemia).
- Aumento de los valores de la función hepática (que puede indicar daño hepático), incluyendo un aumento de la bilirrubina en la sangre (que puede, en casos graves, ocasionar piel y ojos amarillos).
- Aumento del nivel de creatinina sérica (que puede indicar la función renal anormal).
- Aumento del nivel de potasio en la sangre (que, en casos severos, puede provocar espasmos musculares, ritmo cardíaco anormal).

Los siguientes efectos también se han observado durante los ensayos clínicos con valsartán, sin posibilidad de determinar si son causados por la droga u otras causas: dolor de espalda, cambios en la

libido, inflamación de los senos, insomnio, dolor en las articulaciones, faringitis, secreción o congestión nasal, hinchazón de las manos, tobillos o pies, infecciones en las vías respiratorias superiores, infecciones virales.

Si Ud. padece alguno de estos efectos, comuníquelo a su médico.

#### Hidroclorotiazida

Algunos efectos adversos pueden ser serios

Si Ud. experimenta:

- Erupción cutánea con o sin dificultades en la respiración (posibles signos de reacciones de hipersensibilidad).
- Erupción facial, dolor articular, trastorno muscular, fiebre (posibles signos de lupus eritematoso sistémico).
- Erupción cutánea, rojo, ampollas en los labios, ojos o boca, descamación de la piel, fiebre (posibles signos de necrólisis epidérmica tóxica, eritema multiforme).
- Erupción cutánea, manchas rojo púrpura, fiebre, picazón (posibles signos de vasculitis necrotizante).
- Cansancio o debilidad inusual, espasmos musculares, ritmo cardíaco anormal (posibles signos de hipopotasemia).
- Cansancio inusual, confusión, contracciones musculares o convulsiones (posibles signos de hiponatremia).
- Confusión, cansancio, calambres musculares y espasmos, respiración rápida (posibles signos de la alcalosis hipoclorémica).
- Trastornos gastrointestinales, como náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor de estómago, orina frecuente, sed, debilidad muscular y espasmos (posibles signos de hipercalcemia).
- Dolor intenso parte superior del estómago (posibles signos de pancreatitis).
- Vómitos severos o persistentes o diarrea.
- Latidos cardíacos irregulares (posibles signos de arritmia).
- Manchas de la piel de color púrpura (posibles signos de trombocitopenia, púrpura).
- Fiebre, dolor de garganta, infecciones más frecuentes (posibles signos de agranulocitosis).
- Fiebre, dolor de garganta o úlceras en la boca debido a infecciones (posibles signos de leucopenia).
- Debilidad, infecciones frecuentes y hematomas (posibles signos de pancitopenia, depresión de la médula ósea).
- Palidez, cansancio, dificultad para respirar, orina oscura (posibles signos de anemia hemolítica).
- Disminución grave de la producción de orina (posibles signos de trastorno renal o insuficiencia renal).
- Disminución de la visión o dolor en los ojos debido a alta presión (posibles signos de glaucoma agudo de ángulo cerrado).
- Cáncer de piel no melanoma (aparición de un bulto o parche descolorido en la piel que persiste después de algunas semanas, y progresa lentamente durante meses o a veces años o de bultos cancerosos que son rojos / rosados y firmes y algunas veces se convierten en úlceras; mientras que los parches cancerosos generalmente son planos y escamosos; a menudo se desarrollan en áreas de la piel regularmente expuestas al sol, como la cara, las orejas, las manos, los hombros, la parte superior del pecho y la espalda).

Si Ud. padece alguno de estos efectos, comuníquelo a su médico de inmediato.

Algunos efectos adversos son muy frecuentes (afectan como mucho a 1 de cada 10 pacientes):

- Altos niveles de lípidos en la sangre (hiperlipidemia).

Si Ud. padece alguno de estos efectos, comuníquelo a su médico.

Algunos efectos adversos son frecuentes (afectan como mucho 1 a 10 de cada 100 pacientes):

- Niveles bajos de magnesio en su sangre (hipomagnesemia).
- Altos niveles de ácido úrico en la sangre (hiperuricemia).
- Erupción cutánea con picazón u otras formas de erupción cutánea (urticaria).
- Disminución del apetito, náuseas y vómitos leves.
- Mareos, desmayos al ponerse de pie (hipotensión ortostática).
- Incapacidad de lograr o mantener una erección (impotencia).

Si Ud. padece alguno de estos efectos, comuníquelo a su médico.

Algunos efectos adversos son raros (afectan como mucho a 1 de 10 de cada 10000 pacientes):

- Niveles elevados de azúcar en la sangre o en la orina (hiperglucemia, glucosuria).
- Aumento de la sensibilidad de la piel al sol (fotosensibilidad).
- Malestar abdominal, estreñimiento o diarrea.
- Ojos y piel amarillentos (colestasis o ictericia).
- Dolor de cabeza.
- Mareos.
- Trastornos del sueño.
- Depresión.
- Sensación de hormigueo o entumecimiento (parestesia).
- Trastorno de la vista (discapacidad visual).

Si Ud. padece alguno de estos efectos, comuníquelo a su médico.

Otros efectos adversos de reporte espontáneo:

- Espasmos musculares.
- Fiebre (pirexia).
- Debilidad (astenia).

Si Ud. padece alguno de estos efectos, comuníquelo a su médico de inmediato.

Si observa algún otro efecto no mencionado en este folleto, por favor infórmelo a su médico o farmacéutico.

**¿Cómo conservar DILCORAN PLUS D?**

- Conservar en su envase original en lugar seco, desde 15°C hasta 30 °C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

**Presentación**

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

**Fecha de última revisión:** Septiembre de 2022.

**Esta especialidad medicinal está libre de gluten.**



***Si Ud. toma dosis mayores de DILCORAN PLUS D de las que debiera***

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.**

**No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT**

**<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a**

**ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 59.767

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

