

DILCORAN® PLUS



VALSARTAN 80 mg; AMLODIPINA 5 mg
VALSARTAN 160 mg; AMLODIPINA 10 mg
VALSARTAN 160 mg; AMLODIPINA 5 mg
VALSARTAN 320 mg; AMLODIPINA 10 mg
VALSARTAN 320 mg; AMLODIPINA 5 mg
INFORMACION PARA EL PACIENTE
CONSULTE A SU MEDICO

Comprimidos recubiertos

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar DILCORAN PLUS y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas

Cada comprimido recubierto contiene: Valsartan 80,000 mg, Amlodipina (como Besilato) 5,000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal (Aerosil 200), crospovidona, copovidona, estearato de magnesio, dióxido de titanio, talco, óxido de hierro amarillo (CI N° 77492), polietilenglicol 6000, povidona K 30, hidroxipropilmetilcelulosa E-15.

Cada comprimido recubierto contiene: Valsartan 160,000 mg, Amlodipina (como Besilato) 10,000 mg. Excipientes: crospovidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, propilenglicol, dióxido de titanio, polietilenglicol 6000, povidona K30, talco, hidroxipropilcelulosa, óxido hierro amarillo (CI N° 77492).

Cada comprimido recubierto contiene: Valsartan 160,000 mg, Amlodipina (Como Besilato) 5,000 mg. Excipientes: crospovidona, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, propilenglicol, dióxido de titanio, polietilenglicol 6000, povidona K30, talco, hidroxipropilcelulosa, óxido hierro amarillo (CI N° 77492).

Cada comprimido recubierto contiene: Valsartan 320,000 mg, Amlodipina (como Besilato) 10,000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona, estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal (Aerosil 200), copovidona, dióxido de titanio, hidroxipropilmetilcelulosa E-15, polietilenglicol 6000, povidona K 30, talco, óxido de hierro rojo (CI N° 77491).

Cada comprimido recubierto contiene: Valsartan 320,000 mg, Amlodipina (como Besilato) 5,000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal, crospovidona, copovidona, estearato de magnesio, dióxido de titanio, talco, hidroxipropilmetilcelulosa E-15, polietilenglicol 6000, povidona K-30.

¿Qué es DILCORAN PLUS y para qué se utiliza?

¿Qué es DILCORAN PLUS?

DILCORAN PLUS es un medicamento que se presenta en forma de comprimidos recubiertos para tomar por boca, contiene amlodipina, una sustancia perteneciente a la clase de los bloqueantes de canales de calcio, y valsartán, un miembro de la clase de los denominados "antagonistas de los receptores de la angiotensina". Ambos contribuyen a regular la tensión arterial alta. Como resultado de ambos procesos, los vasos sanguíneos se relajan y la tensión arterial disminuye.

¿Para qué se utiliza DILCORAN PLUS?

DILCORAN PLUS se utiliza para tratar la tensión arterial alta. Cuando la tensión arterial alta persiste durante mucho tiempo se pueden dañar los vasos sanguíneos del cerebro, el corazón y los riñones, y ello puede traer aparejado un accidente cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal. La reducción de la tensión arterial hasta niveles normales reduce el riesgo de padecer dichos trastornos. Un paciente puede tener la presión arterial alta y no tener síntomas.

Antes de usar este medicamento

Lea cuidadosamente este prospecto antes de utilizar **DILCORAN PLUS**.

Conserve este prospecto. Puede que deba volver a leerlo.

Este medicamento ha sido prescrito solamente para usted. No lo recomiende a nadie ni lo utilice para curar otras enfermedades.

Si tiene alguna duda, por favor, pregunte al médico o al farmacéutico.

Siga cuidadosamente las indicaciones que le ha dado el médico. Pueden diferir de la información contenida en este prospecto.

No utilice DILCORAN PLUS

- **Si usted padece** o ha padecido una reacción alérgica o inusual a la amlodipina, al valsartán o a cualquiera de los componentes del producto enumerados al principio de este prospecto. Si usted sospecha que es alérgico, consulte con el médico.
- **Si está embarazada o prevé embarazarse.**

Si usted se encuentra en cualquiera de estos casos, comuníquelo al médico y no utilice **DILCORAN PLUS**.

Sea especialmente cuidadoso con DILCORAN PLUS

- **Si usted está sufriendo** episodios reiterados de vómitos o diarrea o está tomando algún diurético (una sustancia que aumenta el volumen de orinal).
- **Si está tomando** otros medicamentos o sustancias que aumentan las concentraciones de potasio en la sangre (como ciertas clases de diuréticos, suplementos de potasio, etc).
- **Si está tomando** unos medicamentos que se llaman "B-bloqueantes". El médico lo orientará sobre la reducción gradual de la dosis.
- **Si sufre** de trastornos hepáticos o renales graves.
- **Si** el médico le ha diagnosticado un estrechamiento de las válvulas del corazón (denominado "estenosis aórtica o mitral) o un aumento anómalo del espesor del músculo del corazón con estrechamiento o hipertrofia (denominado "miocardiopatía hipertrófica obstructiva").

Si usted se encuentra en cualquiera de estas situaciones, **dígasele al médico antes** de tomar **DILCORAN PLUS**.

Comunique asimismo al médico si usted ha recibido un trasplante renal o si le han diagnosticado un estrechamiento de la arteria renal.

Toma de DILCORAN PLUS con alimentos y bebidas

Usted puede tomar **DILCORAN PLUS** con o sin alimentos.

DILCORAN PLUS y las personas de edad avanzada

No hay ninguna recomendación posológica especial para los pacientes mayores de 65 años.

Niños y adolescentes (menores de 18 años)

No se recomienda la utilización de **DILCORAN PLUS** en los niños y adolescentes.

Embarazo

No utilice **DILCORAN PLUS** si está embarazada o prevé embarazarse. El uso de este medicamento durante el embarazo puede causar graves daños al feto. Por consiguiente, es importante que usted consulte con el médico de inmediato si piensa que está embarazada o tiene pensado estarlo.

Su médico le explicará el posible riesgo de tomar DILCORAN PLUS durante el embarazo.

Lactancia

Si usted amamanta, dígaselo al médico. No se recomienda el tratamiento con **DILCORAN PLUS** durante la lactancia.

Conducción y utilización de máquinas

Al igual que muchos otros medicamentos utilizados para el tratamiento de la presión arterial alta, en raras ocasiones, **DILCORAN PLUS** puede producir mareos y disminuir la capacidad de concentración. Así pues, antes de conducir un vehículo, utilizar máquinas o llevar a cabo otras actividades que exigen concentración, asegurese de estar familiarizado con los efectos de **DILCORAN PLUS**.

Toma de otros medicamentos con DILCORAN PLUS

Si usted está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, comuníquese al médico o al farmacéutico. Puede ser necesario modificar la dosis, tomar otros recaudos y, en algunos casos, dejar de tomar uno de los medicamentos. Esto vale tanto para los medicamentos de venta con receta (prescritos por un médico) como para los de venta libre (no prescritos por un médico), especialmente para los:

- Medicamentos ahorradores de potasio, suplementos de potasio u otros sustitutos salinos que contengan potasio.
- Ciertos tipos de analgésicos denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (inhibidores de la Cox-2).

Su médico también puede monitorear su función renal.

Uso apropiado del medicamento

Para obtener óptimos resultados y reducir el riesgo de aparición de efectos secundarios, es extremadamente importante que usted tome este medicamento exactamente como el médico se lo ha dicho. **DILCORAN PLUS** es para uso oral únicamente.

No sobrepase la dosis recomendada.

Cantidad de DILCORAN PLUS que debe tomar

El médico le dirá exactamente cuántos comprimidos de **DILCORAN PLUS** debe tomar. Según como usted responda al tratamiento, podrá indicarle una dosis mayor o menor. La dosis recomendada de **DILCORAN PLUS** es 1 comprimido recubierto con película al día.

¿Cuándo y cómo debe tomar DILCORAN PLUS?

DILCORAN PLUS se puede tomar con o sin alimentos. Ingiera los comprimidos con un vaso con agua.

Si está tomando **DILCORAN PLUS**, comuníquelo a su médico o dentista en caso de ser sometido a una intervención quirúrgica o en caso de ser sometido a diálisis.

Duración del tratamiento con DILCORAN PLUS

El médico le dirá exactamente durante cuánto tiempo deberá tomar usted los comprimidos de **DILCORAN PLUS**. Como todo tratamiento para la presión arterial alta, en principio es prolongado.

Si se olvida de tomar DILCORAN PLUS

Conviene tomar el medicamento todos los días a la misma hora, preferentemente por la mañana. Si alguna vez se olvida de tomar **DILCORAN PLUS**, tómelo en cuanto se acuerde y luego tome la próxima dosis en el horario habitual. No obstante, si ya es tiempo de tomar la segunda dosis, no tome la dosis que olvidó. No duplique la dosis para compensar la dosis olvidada.

Si toma más DILCORAN PLUS de lo debido

Si usted ha tomado por accidente demasiados comprimidos de **DILCORAN PLUS**, consulte con el médico de inmediato.

Efectos de suspender el tratamiento con DILCORAN PLUS

La suspensión del tratamiento con **DILCORAN PLUS** puede agravar su enfermedad. No deje de tomar este medicamento a menos que el médico se lo indique.

Efectos indeseables

Como todos los medicamentos, **DILCORAN PLUS** puede causar efectos secundarios, si bien no todo el mundo los padece.

Algunos efectos adversos pueden ser graves:

Raros (afectan como mucho a 1 de cada 1000 pacientes)

Reacciones alérgicas con síntomas tales como erupción cutánea, picazón, hinchazón de rostro, labios o lengua, dificultad para respirar, tensión arterial baja. Si usted padece alguno de estos efectos, comuníquelo al médico de inmediato.

Otros posibles efectos secundarios son:

Frecuentes (afectan como mucho a 1 de cada 10 pacientes)

Síntomas parecidos a los de la gripe; congestión nasal; dolor de garganta y malestar al deglutir, dolor de cabeza, hinchazón de brazos, manos, piernas, tobillos o pies; cansancio, rubefacción y sensación de calor en el rostro o el cuello.

Poco frecuentes (afectan como mucho a 1 de cada 100 pacientes)

Mareo; náuseas y dolor de vientre; boca seca; somnolencia, hormigueo o adormecimiento de las manos o los pies; vértigo, latido acelerado del corazón, también palpitaciones; mareos al ponerse de pie, tos; diarrea; estreñimiento, erupción cutánea, enrojecimiento de la piel, hinchazón de articulaciones, dolor de espalda, dolor de articulaciones.

Raros (afectan como mucho a 1 de cada 1000 pacientes)

Ansiedad o angustia, zumbido de oído, desmayo, producción de orina mayor de lo normal o sensación de necesidad imperiosa de orinar, dificultad para conseguir o mantener una erección, sensación de pesadez, tensión arterial baja con síntomas tales como mareo, sensación de vahído, excesiva transpiración, erupción cutánea generalizada, picazón, espasmo muscular.

Si alguno de estos efectos son graves comuníquelo al médico

También se pueden producir otros efectos indeseados con la amlodipina o el valsartán por separado, por ejemplo:

Amlodipina

Dolor de estómago con náuseas, engrosamiento de encías, aumento de tamaño de las mamas en los varones, menor número de células blancas de la sangre, lo cual puede aumentar el riesgo de infección, dolor muscular, inflamación de páncreas o hígado, lo cual puede producir síntomas tales como vómitos, pérdida de apetito, náuseas coloración amarilla de la piel y los ojos, menor número de plaquetas en la sangre, que hace que se produzcan derrames de sangre o moretones (cardenales) con mayor facilidad, inflamación de los vasos sanguíneos con erupción cutánea como síntoma, dificultad para respirar, hinchazón de pies o piernas por acumulación de líquido, fatiga con facilidad tras una actividad física ligera (trastorno del corazón), dolor de pecho agudo (signo de infarto de miocardio o severidad de la angina), latidos cardíacos irregulares (signos de arritmias).

Valsartán

Menor número de células blancas de la sangre, lo cual puede aumentar el riesgo de infección.

Si usted padece alguno de estos efectos, comuníquelo al médico de inmediato.

Si usted nota algún efecto no señalado en este prospecto, por favor, hágalo saber al médico o al farmacéutico.

¿Cómo conservar DILCORAN PLUS?

- Conservar en su envase original desde 15 °C hasta 30 °C. Proteger de la humedad.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación:

DILCORAN PLUS 80 mg - 5 mg; DILCORAN PLUS 320 mg - 5 mg; DILCORAN PLUS 320 mg - 10 mg: envases con 30 comprimidos recubiertos.

DILCORAN PLUS 160 mg - 5 mg; DILCORAN PLUS 160 mg – 10 mg: envases con 28, 30 y 56 comprimidos recubiertos.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Febrero de 2024

Si ud se aplica dosis mayores de DILCORAN PLUS de las que debiera

En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico.,
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

**“Este medicamento ha sido prescrito sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N ° 57.382

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

