

SIMETICONA 200 mg
PROSPECTO

Comprimidos

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Fórmula

Cada comprimido contiene:

Simeticona 200,00 mg. Excipientes: amarillo ocaso 0,002 mg, fosfato tricálcico 481,241 mg, celulosa microcristalina 183,500 mg, almidón pregelatinizado 13,500 mg, gelatina 13,500 mg, croscarmelosa sódica 23,000 mg, esencia de menta 1,850 mg, sacarina sódica 1,850 mg, tartrazina 0,057 mg, dióxido de silicio coloidal 27,000 mg, estearato de magnesio 4,500 mg.

Acción Terapéutica

Antiflatulento.

Código ATC: **A03AX13**

Indicaciones

FACTOR AG 200 está indicado en todos aquellos procesos que cursan con disconfort abdominal debido a un exceso de gas en el sistema gastrointestinal.

Se encuentra también indicado en la preparación del tubo digestivo para procedimientos endoscópicos, radiográficos o ecográficos.

Acción Farmacológica

La simeticona reduce la tensión superficial de las burbujas aéreas en el tubo digestivo facilitando su dispersión y por lo tanto su eliminación aliviando los síntomas secundarios al exceso de gas en el tracto gastrointestinal.

Farmacocinética

La simeticona actúa a nivel de la luz intestinal sin modificarse ni absorberse.

Posología - Modo de Administración

Adultos y niños mayores de 12 años:

Un comprimido 2 a 3 veces por día.

Niños entre 6 y 12 años:

Un comprimido 2 veces por día.

Para niños menores de 12 años se recomienda utilizar la forma farmacéutica en gotas.

Preparación para Procedimientos Diagnósticos:

Dos días antes, 2 comprimidos 2 a 3 veces por día. El día del procedimiento, por la mañana y justo antes del mismo, 2 comprimidos.

Contraindicaciones

Íleo de cualquier causa.

Precauciones

Este medicamento contiene tartracina.

Interacciones medicamentosas

FACTOR AG 200 no interfiere habitualmente con la absorción de otros medicamentos.

Sin embargo, la absorción de levotiroxina (medicamento usado en el tratamiento de enfermedades y disfunciones de la glándula tiroides) puede verse afectada si al mismo tiempo se administra simeticona por lo que la toma de preparados con levotiroxina y preparados con simeticona debe separarse al menos 4 horas.

Embarazo y lactancia

FACTOR AG 200 puede utilizarse durante el embarazo o la lactancia ya que la simeticona actúa solo a nivel intestinal sin modificarse ni absorberse.

Reacciones Adversas

No presenta.

Sobredosificación

Aún no se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Presentación

Envases con 20 y 40 comprimidos.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Noviembre de 2017.

Forma de conservación

- Conservar en su envase original en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15°C y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 26.533

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**