

CENOBAMATO 12,5; 25; 50; 100; 150 y 200 mg  
INFORMACION PARA EL PACIENTE  
CONSULTE A SU MÉDICO

Comprimidos /  
Comprimidos recubiertos

**Venta Bajo Receta Archivada**

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **CANFIX** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

## Fórmulas

Cada comprimido de CANFIX 12,5 contiene:

Cenobamato 12,500 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, almidón glicolato sódico, hidroxipropilcelulosa, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio.

Cada comprimido recubierto de CANFIX 25 contiene:

Cenobamato 25,0000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, almidón glicolato sódico, hidroxipropilcelulosa, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, Opadry II blanco (alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, dióxido de titanio, polietilenglicol 3000, talco), óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro.

Cada comprimido recubierto de CANFIX 50 contiene:

Cenobamato 50,0000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, almidón glicolato sódico, hidroxipropilcelulosa, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, Opadry II blanco (alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, dióxido de titanio, polietilenglicol 3000, talco), óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro.

Cada comprimido recubierto de CANFIX 100 contiene:

Cenobamato 100,0000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, almidón glicolato sódico, hidroxipropilcelulosa, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, Opadry II blanco (alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, dióxido de titanio, polietilenglicol 3000, talco), óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro.

Cada comprimido recubierto de CANFIX 150 contiene:

Cenobamato 150,0000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, almidón glicolato sódico, hidroxipropilcelulosa, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, Opadry II blanco (alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, dióxido de titanio, polietilenglicol 3000, talco), óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro.

Cada comprimido recubierto de CANFIX 200 contiene:

Cenobamato 200,0000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, almidón glicolato sódico, hidroxipropilcelulosa, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, Opadry II blanco (alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, dióxido de titanio, polietilenglicol 3000, talco), óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro.

## ¿Qué es CANFIX y para qué se usa?

**CANFIX** es un medicamento recetado que se usa para tratar las convulsiones de inicio parcial en adultos.

## **Antes de usar CANFIX**

### **No use CANFIX si**

- es alérgico al cenobamato o a cualquiera de los demás componentes de **CANFIX**.
- tiene un problema genético (llamado síndrome de intervalo QT corto familiar) que afecta el sistema eléctrico del corazón.

### **Tenga especial cuidado con CANFIX**

Antes de tomar **CANFIX**, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene o ha tenido depresión, problemas de humor o pensamientos o acciones suicidas.
- tiene problemas hepáticos, renales o sanguíneos.
- ha tenido una reacción alérgica a un medicamento que le causó un sarpullido o afectó órganos internos, como el hígado o las células sanguíneas.
- usa medicamentos anticonceptivos. **CANFIX** puede hacer que su medicamento anticonceptivo sea menos eficaz. Hable con su médico sobre el mejor método anticonceptivo que puede usar mientras toma **CANFIX**.
- está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si **CANFIX** dañará a su bebé por nacer. Informe a médico de inmediato si queda embarazada mientras toma **CANFIX**. Usted y su médico decidirán si debe tomar **CANFIX** mientras está embarazada.
- está amamantando o planea amamantar. No se sabe si **CANFIX** pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé mientras toma **CANFIX**.

### **Toma simultánea de otros medicamentos**

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

**CANFIX** puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y estos medicamentos pueden afectar la forma en que actúa **CANFIX**. No comience a tomar un medicamento nuevo sin hablar primero con su médico.

Pídale a su médico o farmacéutico una lista de los medicamentos que está tomando, si no está seguro. Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de ellos y muéstrela a su médico y farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

### **¿Cómo usar CANFIX?**

- Tome **CANFIX** exactamente como le indique su médico.
- Es muy importante aumentar la dosis de **CANFIX** lentamente, según las indicaciones de su médico.
- No deje de tomar **CANFIX** sin hablar con su médico. Dejar de tomar **CANFIX** de repente puede causar problemas graves, incluidas convulsiones que no se detienen (estado epiléptico).
- Su médico puede cambiar su dosis, si es necesario.
- Su médico le indicará la cantidad de **CANFIX** que debe tomar.

### **Embarazo**

No existen datos adecuados sobre el riesgo para el desarrollo del niño en gestación asociado con el uso de cenobamato en mujeres embarazadas. Usted y su médico decidirán si debe tomar **CANFIX** mientras está embarazada.

### **Lactancia**

No se sabe si **CANFIX** pasa a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé mientras toma **CANFIX**.

### **Uso en niños**

No se ha establecido si **CANFIX** es seguro y eficaz en niños.

### ***Uso en ancianos***

No se ha estudiado una cantidad suficiente de pacientes de 65 años o más para determinar la seguridad y eficacia de cenobamato en la población de edad avanzada.

### **Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos y uso de maquinaria**

No conduzca, opere maquinaria ni realice otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afecta **CANFIX**.

**CANFIX** puede enlentecer su pensamiento y sus habilidades motoras y puede afectar su visión.

- No beba alcohol ni tome otros medicamentos que puedan causarle somnolencia o mareos mientras toma **CANFIX** sin hablar primero con su médico.

### ***Toma conjunta de CANFIX con alimentos y bebidas***

**CANFIX** se puede tomar en cualquier momento del día, con o sin alimentos.

- Trague los comprimidos enteros con líquido. No los triture ni los mastique.

### **Uso apropiado del medicamento CANFIX**

*Si se olvidó de tomar CANFIX*, consulte con su médico para que le indique como seguir el tratamiento.

### **A tener en cuenta mientras toma CANFIX**

#### ***Efectos indeseables (adversos)***

**CANFIX** puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre **CANFIX**?”
- problemas con el sistema eléctrico del corazón (acortamiento del intervalo QT). Llame a su médico si tiene síntomas de acortamiento del intervalo QT, como latidos cardíacos rápidos (palpitaciones cardíacas) que duran mucho tiempo o desmayos.
- problemas del sistema nervioso. **CANFIX** puede causar problemas que pueden afectar su sistema nervioso. Los síntomas de los problemas del sistema nervioso incluyen:
  - mareos
  - dificultad para caminar o con la coordinación
  - sensación de sueño y cansancio
  - dificultad para concentrarse, recordar y pensar con claridad
  - problemas de visión

Los efectos secundarios más comunes de **CANFIX** incluyen:

- sensación de sueño y cansancio
- mareos
- visión doble
- dolor de cabeza

Informe a su médico si presenta algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **CANFIX**.

### **¿Cómo conservar CANFIX?**

- Conservar en su envase original, en lugar seco, desde 15°C hasta 25°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

### ***Si Ud. toma dosis mayores de CANFIX de las que debiera***

Si toma demasiado **CANFIX**, llame a su médico o acuda de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

**Esta especialidad medicinal está libre de gluten.**



#### **Presentaciones**

CANFIX 12,5 mg: Envase con 14 comprimidos.

CANFIX 25 mg y 50 mg: Envase con 14 comprimidos recubiertos.

CANFIX 100 mg: envases con 14 y 30 comprimidos recubiertos.

CANFIX 150 mg y 200 mg: envases 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: Febrero de 2026.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.  
No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar  
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT**

**<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a  
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 60.541

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**