

# BLOKIU<sup>®</sup> 25



DICLOFENAC SÓDICO 25 mg  
PROSPECTO DEL USUARIO

Comprimidos Recubiertos

**Venta Libre**

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

## ¿QUÉ CONTIENE BLOKIU 25?

Cada comprimido recubierto contiene: Ingrediente activo: Diclofenac sódico 25 miligramos. Ingredientes inactivos: cellactose 80, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, talco, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, povidona, bióxido de titanio, sacarina sódica, polietilenglicol 6000, propilenglicol.

## ACCIONES

Analgésico. Antiinflamatorio.

## ¿PARA QUE SE USA BLOKIU 25?

**BLOKIU 25** es un medicamento que se utiliza para el alivio de dolores musculares y de articulaciones, especialmente los que se acompañan de inflamación. También está indicado en dolores de espalda, dolor de cabeza, dolores dentales y dolor menstrual.

## ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR BLOKIU 25?

NO utilizar **BLOKIU 25** en caso de: alergia conocida a alguno de los componentes del producto, a la aspirina u otros antiinflamatorios; úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias; hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante; insuficiencia hepática o renal; enfermedades serias de la sangre; uso de diuréticos; embarazo o lactancia.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Antes de utilizar **BLOKIU 25** conjuntamente con otros medicamentos es conveniente consultar al médico.

- Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica.
- Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo.

Si usted tiene dudas con respecto a estas instrucciones consulte con su médico.

**No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. BLOKIU 25 no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que aparece en el dorso del envase.**

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea o dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel.

Síntomas de hipersensibilidad: picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas o manos, dificultad para respirar.

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece cualquier síntoma que le impresione relacionado al uso del producto, que le ocasione preocupación o que le parezca poco usual.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Este medicamento está contraindicado en embarazo y lactancia.

### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

- Adultos y niños mayores de 15 años: 1 comprimido recubierto de BLOKIUM 25 tres veces al día (cada 8 horas).
- Dolor menstrual: 1 comprimido recubierto de **BLOKIUM 25** 1 ó 2 veces por día.
- Dosis máxima: 3 comprimidos recubiertos de **BLOKIUM 25** al día. No superar la dosis máxima recomendada ni acortar los intervalos entre las dosis salvo por orden médica.

Mayores de 65 años o menores de 15 años: consulte con su médico.

Transcurridos 3 días de uso sin mejoría o con empeoramiento de los síntomas, se recomienda consultar al médico.

No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.

Ingerir los comprimidos recubiertos de **BLOKIUM 25** con suficiente líquido. La presencia de alimentos en el estómago en el momento de la ingestión suele mejorar la tolerabilidad, sin afectar su efecto terapéutico en forma significativa.

### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un centro de toxicología, en especial:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

### ¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese al siguiente teléfono:

ANMAT Responde: 0800 333 1234

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

### FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15° C y 30° C.

Fecha de última revisión: Octubre de 2024

### Presentaciones

Envases con 10, 20 y 100 comprimidos recubiertos.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.  
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.  
Certificado N° 36.717  
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.  
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

