
BLOKIUM® 50



DICLOFENAC SODICO 50 mg

Comprimidos Recubiertos

BLOKIUM® 75



DICLOFENAC SODICO 75 mg

Comprimidos Recubiertos

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
CONSULTE A SU MÉDICO

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar este medicamento y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas

BLOKIUM 50

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenac sódico 50,00 mg. Excipientes: cellactose 80; Avicel PH 200; Ac-Di-Sol; estearato de magnesio; Eudragit L30 D 55 emulsión; Tween 80; trietilcitrate; talco; dióxido de titanio; óxido de hierro amarillo; óxido de hierro rojo.

BLOKIUM 75

Cada comprimido recubierto contiene:

Diclofenac sódico 75,00 mg. Excipientes: lactosa; hidroxipropilmetilcelulosa E-15; hidroxipropilmetilcelulosa K-100; povidona K-30; triacetina; fosfato bicálcico; estearato de magnesio; talco; polietilenglicol 6000; propilenglicol; bióxido de titanio; sacarina sódica; óxido de hierro rojo.

¿Qué es BLOKIUM y para qué se usa?

El diclofenac, principio activo de BLOKIUM 50 y BLOKIUM 75 pertenece a una clase de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Actúa impidiendo que el organismo produzca una sustancia que causa dolor, fiebre e inflamación.

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

El diclofenac se usa para aliviar el dolor, la sensibilidad, la inflamación y la rigidez ocasionados por la osteoartritis (artritis debida al desgaste del revestimiento de las articulaciones), la artritis reumatoide (artritis debida a la inflamación del revestimiento de las articulaciones), la espondilitis anquilosante (artritis que afecta principalmente la columna vertebral), periodos menstruales dolorosos y dolores por otras causas.

No tome este medicamento si:

- Tiene hipersensibilidad al diclofenac;
- Tiene una gastritis aguda o una úlcera gastroduodenal en actividad;
- Tiene ataques de asma, urticaria o rinitis aguda desencadenadas por administración de aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos;
- Durante el 3° trimestre del embarazo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

BLOKIUM se presenta en forma de comprimidos recubiertos de liberación inmediata, para administración por vía oral. Por lo general, los comprimidos recubiertos se toman de 2 a 3 veces al día. Tome BLOKIUM más o menos a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones de la receta y pídale a su médico o farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda.

- Tome BLOKIUM tal como se lo indiquen. No aumente ni disminuya la dosis, ni lo tome con más frecuencia que la indicada por su médico.
- A veces se receta este medicamento para otros usos; pídale más información a su médico o a su farmacéutico.

Embarazo

Precauciones durante el embarazo y en mujeres en edad fértil

Debido a que la administración de medicamentos del tipo diclofenac se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible.

En el tercer trimestre la administración de este medicamento está contraindicada.

Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos que contienen diclofenac se han asociado con una disminución de la capacidad para concebir.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de tomar diclofenac:

- Dígale a su médico y a su farmacéutico si usted es alérgico al diclofenac, la aspirina u otros AINEs como ibuprofeno o naproxeno, a cualquier otro medicamento, o a cualquiera de los excipientes (ingredientes no activos) de los comprimidos de diclofenac.
- Informe a su médico si toma cualquiera de estos medicamentos: anticoagulantes ("diluyentes de la sangre") como warfarina; aspirina; otros AINEs (como ibuprofeno y naproxeno); corticosteroides (como dexametasona, betametasona, metilprednisolona y prednisona).
- Informe también a su médico y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, complementos nutricionales y productos herbales está tomando o piensa tomar: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA) como enalapril, benazepril, fosinopril, lisinopril, perindopril y ramipril, ciclosporina, digoxina, diuréticos, insulina y medicamentos orales para la diabetes, litio y metotrexato. Es posible que su médico deba cambiar la dosis de sus medicamentos o vigilarle estrechamente por si presentara efectos secundarios.
- Informe también a su médico si tiene o alguna vez ha tenido úlceras, sangrado estomacal o intestinal u otros trastornos hemorrágicos.
- Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido asma, sobre todo si también sufre con frecuencia de congestión, secreción o pólipos nasales (inflamación del revestimiento interior de la nariz); lupus (un trastorno en el que el organismo ataca muchos de sus propios tejidos y órganos, incluyendo con frecuencia la piel, las articulaciones, la sangre y los riñones); porfiria (aumento anormal de la cantidad de ciertas sustancias naturales que produce el hígado); alguna enfermedad del hígado, del riñón o corazón; o hinchazón de manos, pies, tobillos o pantorrillas.
- Informe a su médico si está embarazada, sobre todo si está en los últimos meses de gestación, si planea quedar embarazada o si está lactando. Si queda embarazada mientras toma diclofenac, llame a su médico.
- Si tiene programada una cirugía, incluso una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está tomando diclofenac.

Precauciones cardiovasculares

Los medicamentos que contienen diclofenac se pueden asociar con un moderado aumento del riesgo de sufrir ataques cardiacos (“infarto de miocardio”) o cerebrales, especialmente cuando se emplean en dosis altas y en tratamientos prolongados. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendado. Si usted tiene problemas cardiacos, antecedentes de ataques cerebrales o piensa que puede tener riesgo de sufrir estas patologías (por ejemplo, tiene la tensión arterial alta, sufre diabetes, tiene aumentado el colesterol, o es fumador) debe consultar este tratamiento con su médico o farmacéutico. Asimismo, este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, especialmente en pacientes con insuficiencia cardiaca y/o tensión arterial elevada (hipertensión).

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, salte la que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

Los AINEs como el diclofenac pueden causar úlceras, sangrado o perforaciones en el estómago o el intestino. Estos problemas pueden surgir en cualquier momento durante el tratamiento, presentarse sin síntomas de advertencia e incluso causar la muerte. El riesgo puede ser mayor para quienes toman AINEs por mucho tiempo, son de edad avanzada, tienen problemas de salud o beben grandes cantidades de alcohol mientras toman diclofenac. Si tiene cualquiera de estos síntomas, deje de tomar el diclofenac y llame a su médico: dolor estomacal, acidez estomacal, vómito de una sustancia sanguinolenta o semejante a posos de café, sangre en las heces, o heces negras y con aspecto de alquitrán.

El diclofenac puede provocar otros efectos secundarios. Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas es intenso grave o no desaparece,

- Diarrea
- Estreñimiento
- Gases o hinchazón abdominal
- Dolor de cabeza
- Mareos
- Zumbido en los oídos
- Aumento de peso inexplicable
- Cansancio excesivo
- Falta de energía
- Malestar estomacal
- Pérdida de apetito
- Comezón
- Dolor en la parte superior derecha del abdomen
- Coloración amarilla de la piel o los ojos
- Síntomas parecidos a los de la influenza
- Fiebre
- Ampollas
- Sarpullido
- Urticaria
- Hinchazón de ojos, cara, lengua, labios, garganta, brazos, manos, pies, tobillos o pantorrillas
- Dificultad para respirar o tragar
- Ronquera

- Palidez
- Latido del corazón acelerado
- Orina turbia, pálida o sanguinolenta
- Dolor de espalda
- Dificultad o dolor al orinar

¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento?

Mantenga este producto en su envase original, perfectamente cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15°C y 30°C (nunca en el cuarto de baño). Deseche todos los medicamentos que estén vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su farmacéutico cuál es la manera adecuada de desechar los medicamentos.

¿Qué otra información de importancia debería saber?

No falte a ninguna cita con su médico y con el laboratorio. El médico vigilará de cerca sus síntomas, y no olvide informar a su médico cómo se siente, de modo que pueda recetarle la cantidad correcta de medicamento para tratar su afección.

No permita que ninguna otra persona use sus medicamentos. Pregúntele a su farmacéutico cómo puede volver a surtir su receta.

Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

Los síntomas de sobredosis son, entre otros:

- Malestar estomacal.
- Vómitos.
- Dolor de estómago.
- Heces negras, con aspecto de alquitrán o sanguinolentas.
- Vómito de una sustancia sanguinolenta o con aspecto de posos de café.
- Somnolencia.
- Respiración lenta, superficial o irregular.
- Pérdida del conocimiento.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Presentaciones

BLOKIUM 50: envases con 15, 30 y 100 comprimidos recubiertos.

BLOKIUM 75: envases con 15 y 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: Octubre de 2020.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas”.**
**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.
Certificado N° 36.717
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

