

# BLOKIUM<sup>®</sup> 100



DICLOFENAC SODICO 100 mg  
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE  
CONSULTE A SU MÉDICO

Comprimidos recubiertos de acción prolongada

**Venta Bajo Receta**

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar este medicamento y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

## **Fórmula**

Cada comprimido recubierto de acción prolongada contiene: Diclofenac sódico 100,00 mg. Excipientes: lactosa; hidroxipropilmetilcelulosa E-15; hidroxipropilmetilcelulosa K-100; povidona K-30; triacetina; fosfato bicálcico; estearato de magnesio; talco; polietilenglicol 6000; sacarina sódica; bióxido de titanio; óxido de hierro rojo.

## **¿Qué es BLOKIUM 100?**

**BLOKIUM 100** es un medicamento que tiene como principio activo diclofenac sódico. El diclofenac pertenece al grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroides (AINEs).

## **¿Para qué se usa BLOKIUM 100?**

**BLOKIUM 100** se emplea en los casos de inflamación y dolor en articulaciones y/o músculos, producidos por diversas causas (traumatismos, distintos tipos de reumatismos).

## **Antes de usar BLOKIUM 100**

### **No use BLOKIUM 100 si**

- es alérgico al diclofenac o a cualquiera de los demás componentes del medicamento;
- es alérgico o ha tenido reacciones alérgicas al ácido acetilsalicílico u otros analgésicos similares. Las reacciones pueden incluir asma (dificultad para respirar), urticaria o rinitis aguda (inflamación de la mucosa nasal);
- sufre una enfermedad inflamatoria intestinal activa (colitis ulcerosa, enfermedad Crohn);
- padece una enfermedad de riñón moderada o grave;
- tiene una enfermedad del hígado grave;
- sufre alteraciones en la coagulación de la sangre o recibe tratamiento para ello;
- ha tenido anteriormente una hemorragia de estómago o duodeno o ha sufrido una perforación del aparato digestivo mientras tomaba un medicamento antiinflamatorio no esteroideo;
- padece actualmente o ha padecido en más de una ocasión úlcera o una hemorragia de estómago o duodeno;
- padece una insuficiencia cardíaca grave;
- si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo

## **Tenga especial cuidado con BLOKIUM 100**

- si ha tenido alguna enfermedad de estómago o intestino, si ha tenido dolor de estómago o ardor tras tomar antiinflamatorios en el pasado;
- si presenta alguna de las siguientes afecciones: asma, enfermedad del corazón, hígado o riñón, hipertensión, trastornos hemorrágicos u otros trastornos sanguíneos incluyendo porfiria hepática;
- si está tomando medicamentos diuréticos (que aumentan el volumen de orina);

- ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el duodeno, pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro, o incluso sin síntomas previos de alerta.

El riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados, en pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en los ancianos. En estos casos su médico considerará la posibilidad de asociar un medicamento protector del estómago.

#### Precauciones cardiovasculares

Los medicamentos como diclofenac se pueden asociar con un moderado aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos ("infarto de miocardio") o cerebrales, especialmente cuando se emplean en dosis altas y en tratamientos prolongados. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendados. Si usted tiene problemas cardíacos, antecedentes de ataques cerebrales o piensa que puede tener riesgo de sufrir estas patologías (por ejemplo, tiene la tensión arterial alta, sufre diabetes, tiene aumentado el colesterol, o es fumador) debe consultar este tratamiento con su médico o farmacéutico. Asimismo, este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca y/o tensión arterial elevada (hipertensión).

#### **Informe a su médico**

- si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre o aumentan el riesgo de úlceras, como anticoagulantes orales, o antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido acetilsalicílico. También debe comentarle la utilización de otros medicamentos que podrían aumentar el riesgo de dichas hemorragias como los corticoides.
- si padece o enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, pues los medicamentos del tipo de **BLOKIUUM 100** pueden empeorar esta patología.

No debe usar **BLOKIUUM 100** más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

#### **Embarazo**

##### Precauciones durante el embarazo y en mujeres en edad fértil

Debido a que la administración de medicamentos del tipo diclofenac se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos la dosis y duración se limitará al mínimo posible.

En el tercer trimestre la administración de este medicamento está contraindicada.

Para las pacientes en edad fértil se debe tener en cuenta que los medicamentos que contienen diclofenac se han asociado con una disminución de la capacidad para concebir.

#### **Lactancia**

**BLOKIUUM 100** (diclofenac sódico) se elimina en cantidades pequeñas a la leche materna, por lo que en caso de amamantamiento durante su administración no es de esperar efectos indeseables en el lactante.

#### **Uso apropiado del medicamento**

Siga esas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas. En caso de duda consulte con su médico.

La dosis habitual es de 1 comprimido de **BLOKIUUM 100** una vez al día, con el estómago ocupado. El comprimido debe ingerirse entero, sin romper o masticar.

#### **Uso en niños**

No se recomienda el uso de **BLOKIUUM 100** en niños.

### Uso en ancianos

Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles a los efectos de **BLOKIUM 100**. Por ello es especialmente importante que los pacientes de edad avanzada informen inmediatamente al médico de los efectos adversos que les ocurran.

### Forma de administración

**BLOKIUM 100** debe ingerirse entero, junto con líquidos, y con una comida. Tome **BLOKIUM 100** aproximadamente a la misma hora todos los días.

### Efectos adversos

Como todos los medicamentos, **BLOKIUM 100** puede tener efectos adversos.

Estos incluyen dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, digestiones dificultosas (dispepsia), flatulencia, falta de apetito, dolor de cabeza, mareos, vértigo, erupciones en la piel.

*Efectos adversos menos frecuentes (menos del 1% de pacientes tratados) son:*

*Tracto gastrointestinal:* los efectos adversos más frecuentes que ocurren con los medicamentos como **BLOKIUM 100** son los gastrointestinales: úlceras de estómago o duodeno, hemorragias digestivas, perforaciones (en algunos casos mortales), especialmente en los ancianos. También se han observado náuseas, vómitos, diarrea, gases, estreñimiento, ardor de estómago, dolor de vientre, sangre en heces, aftas bucales, empeoramiento de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Menos frecuentemente se ha observado la aparición de gastritis.

*Cardiovasculares:* edema (retención de líquidos), hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca en asociación con tratamientos con medicamentos del tipo **BLOKIUM 100**.

*Respiratorio:* dificultad respiratoria (asma, edema laríngeo).

*Órganos de los sentidos:* silbidos en los oídos.

*Piel:* urticaria, reacciones cutáneas graves, aumento de sensibilidad de la piel a la luz solar, enrojecimiento de la piel.

*Riñones:* anomalías de la función renal que provocan hinchazón de cara, pies o piernas, disminución súbita de la cantidad de orina, orina sanguinolenta, dificultad para orinar.

*Hígado:* medicamentos como **BLOKIUM 100** pueden asociarse, en raras ocasiones a trastornos hepáticos que provocan coloración amarillenta de piel y ojos, algunas veces con fiebre elevada o hinchazón y sensibilidad de la parte superior del abdomen. En este caso, interrumpa el tratamiento e informe INMEDIATAMENTE al médico.

*Sangre:* síntomas de alteraciones graves de las células sanguíneas.

*Hipersensibilidad:* reacciones alérgicas como silbidos en el pecho, dificultad respiratoria o desvanecimiento.

Si se manifiestan alguna de las siguientes reacciones, interrumpa el tratamiento e informe INMEDIATAMENTE al médico:

- molestias gástricas, ardor de estómago o dolor en la parte superior al abdomen.
- vómitos de sangre, heces negras o sangre en la orina.
- Problemas cutáneos como erupción o picor.
- Silbidos en el pecho, dificultad respiratoria.
- Coloración amarillenta de piel u ojos.
- Dolor de garganta persistente o fiebre alta.
- Inflamación de cara, pies o piernas.
- Dolor de cabeza agudo.
- Dolor torácico al toser.

***Si Ud. toma dosis mayores de BLOKIUM 100 de las que debiera***

En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

**Presentación**

Envases con 15 comprimidos recubiertos de acción prolongada.

**Esta especialidad medicinal está libre de gluten.**



Fecha de última revisión: Diciembre de 2019.

**Condiciones de conservación y almacenamiento**

- Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.  
No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar  
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT  
<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a  
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 36.717

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**