

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a usar **ALGICUR** Gel y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada gramo de gel contiene:

Dexketoprofeno trometamol 18,45 mg (equivalente a dexketoprofeno base 12,50 mg). Excipientes: homopolímero de carbomer tipo B, alcohol, trometamol, esencia de lavanda, agua purificada.

¿Qué es ALGICUR y para qué se usa?

ALGICUR contiene dexketoprofeno, principio activo que pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos.

ALGICUR se utiliza para el tratamiento local de afecciones dolorosas e inflamatorias, de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos.

Antes de usar ALGICUR

No use ALGICUR si

- Si existen antecedentes de alergia a dexketoprofeno, ketoprofeno, ácido tiaprofénico o a cualquiera de los componentes de **ALGICUR**.
- Si es alérgico al ácido acetilsalicílico (p. e. aspirina) o a otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo.
- En los ojos ni en las mucosas (boca, nariz y genitales), ni en heridas abiertas u otras lesiones que alteran la integridad de la piel de la zona a tratar.
- Deje de usar **ALGICUR** inmediatamente si experimenta cualquier reacción en la piel incluyendo reacciones cutáneas después de la aplicación simultánea de productos que contengan octocrileno (octocrileno es uno de los excipientes de diversos productos cosméticos y de higiene como champú, loción para después del afeitado, gel de baño y de ducha, cremas para la piel, lápices de labios, cremas antienvjecimiento, desmaquillantes, lacas para el cabello, que se utiliza para retrasar la fotodegradación).
- No exponer las zonas tratadas al sol ni a lámparas de rayos ultravioleta (UVA) durante el tratamiento y las 2 semanas después de la interrupción del mismo.

Tenga especial cuidado con ALGICUR

Para prevenir posibles reacciones alérgicas con la exposición a la luz solar, durante el tratamiento con **ALGICUR**:

- Se debe interrumpir el tratamiento si aparece cualquier reacción en la piel después de la aplicación de **ALGICUR**.
- La exposición al sol (aun estando nublado) o a lámparas de rayos ultravioleta (UVA) de las zonas que han estado en contacto con el producto puede producir reacciones cutáneas (fotosensibilización) potencialmente graves. Por lo tanto es necesario:

- Cubrir con ropa las zonas tratadas para protegerlas durante el tratamiento y durante dos semanas después de su interrupción para evitar cualquier riesgo de fotosensibilización.
- Lavar sus manos a fondo después de cada aplicación de **ALGICUR**.
- Una vez aplicado el gel no debe utilizar ropa ajustada o vendajes oclusivos.

Toma simultánea de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

No es probable que interaccione con otros medicamentos debido a su aplicación directa sobre la piel.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Debe evitarse la administración de **ALGICUR** durante el embarazo, ya que no se ha establecido su seguridad durante este período.

No hay datos suficientes sobre la eliminación de dexketoprofeno en la leche materna, por lo que no se recomienda su uso si está en período de lactancia.

¿Cómo usar ALGICUR?

Siga exactamente las instrucciones de administración de **ALGICUR** indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

La dosis habitual es de dos o tres aplicaciones diarias. La cantidad de gel dependerá del área a tratar, y se aplicará dando un suave masaje con el fin de favorecer la absorción.

La dosis diaria total no debe exceder los 7,5 g por día, lo que equivale a 14 cm de gel.

La duración del tratamiento continuado con dexketoprofeno tópico debe limitarse a un máximo de 7 días.

Uso en niños

No se han establecido aún las dosis ni las indicaciones recomendadas para niños menores de 6 años, por lo que no se recomienda su uso.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir y usar maquinaria.

Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos, **ALGICUR** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Poco frecuentes (entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes)

- Dermatitis (enrojecimiento y/o inflamación de la piel) que incluye reacciones alérgicas en la piel.

Raras (más de uno por cada 1.000 pero igual o menos de uno por cada 10.000 pacientes)

- Enrojecimiento o prominencias en la piel. Reacciones más graves (eccema bulloso o flictenular, erupciones bullosas) que pueden extenderse o generalizarse.

Muy raras (en menos de uno por cada 10.000 pacientes):

- Reacción alérgica que puede manifestarse con urticaria y/o dificultad para respirar (broncoespasmo).

Frecuencia no conocida:

- Reacciones graves en la piel durante la exposición al sol (fotosensibilidad) presentando enrojecimiento e inflamación de la piel, y en algún caso formación de vesículas.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

¿Cómo conservar ALGICUR Gel?

- Conservar en su envase original, en lugar seco a temperatura inferior a 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 50 g.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Marzo de 2018.

Si Ud. usa dosis mayores de ALGICUR de las que debiera

Al tratarse de un preparado tópico, la posibilidad de sobredosificación es remota.

Si se produjera la ingestión accidental del contenido del tubo, el personal sanitario procederá a realizar un lavado gástrico y a la instauración de tratamiento sintomático. El dexketoprofeno es dializable (se elimina mediante diálisis).

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 57.558

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**