

DIACEREINA 50 mg  
INFORMACION PARA EL PACIENTE  
CONSULTE A SU MÉDICO

Cápsulas

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

## Fórmula

Cada cápsula contiene:

Diacereína 50,0 mg. Excipientes: lactosa, povidona K-30, croscarmelosa sódica, polisorbato 80, estearato de magnesio.

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **COMINAR** y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

## ¿Qué es COMINAR y para qué se usa?

**COMINAR** es un medicamento que contiene diacereína, una sustancia con actividad antiinflamatoria y antirreumática.

**COMINAR** se usa en el tratamiento sintomático de la artrosis.

## Antes de usar COMINAR.

### No use COMINAR si

- Es alérgico a la diacereína, a sustancias similares o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Padece determinadas enfermedades del intestino denominadas colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.
- Padece alguna enfermedad grave del hígado o de los riñones.
- Tiene diarrea.

## Tenga especial cuidado con COMINAR

- Si usted ha padecido o padece cualquier enfermedad de los riñones o del hígado.

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **COMINAR**.

## Toma simultánea de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

No se recomienda la administración conjunta de medicamentos para molestias de estómago tales como antiácidos derivados de magnesio, aluminio y calcio porque pueden disminuir la absorción digestiva de diacereína.

**COMINAR** no debe administrarse al mismo tiempo con drogas o sustancias que modifican el tránsito intestinal por ejemplo fibras o fibratos (fenofibrato, benzafibrato, etc).

**COMINAR** puede causar aumento de los trastornos intestinales en aquellos pacientes bajo tratamiento con antibióticos y/o quimioterapia, que puedan afectar la flora intestinal.

**COMINAR** no debe administrarse con sustancias como flavonoides (isoflavonas de soja, revasterol, tioflavonas, antocianidinas, etc.) y taninos.

La reina, metabolito activo de la diacarina, componente activo de **COMINAR** tiene la capacidad de inhibir la degradación de fármacos en el hígado. Por lo tanto **COMINAR** debe suministrarse con precaución con medicamentos que contengan carbamazepina, eritromicina, omeprazol, fenitoina, diclofenac, warfarina y fluoxetina.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Debido a la falta de experiencia clínica, no se aconseja tomar este medicamento durante el embarazo. La diacarina, como los fármacos de su mismo grupo, puede aparecer en la leche materna, por lo que se recomienda no tomar este medicamento durante la lactancia.

### **Uso apropiado de COMINAR**

#### **¿Cómo usar COMINAR?**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda consulte de nuevo a su médico.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con **COMINAR**. No suspenda el tratamiento antes, ya que no se obtendrían los resultados esperados.

**COMINAR** es un medicamento que presenta un inicio lento de acción, pero cuyos efectos perduran bastantes días después de que se haya suprimido el tratamiento. Precisamente por el retraso en su acción inicial, debe tomarse ininterrumpidamente durante al menos 1 mes para empezar a observar sus efectos beneficiosos y puede asociarse a antiinflamatorios o analgésicos durante las primeras semanas de tratamiento para ayudar a controlar los síntomas.

Si estima que la acción de **COMINAR** es demasiado fuerte o débil, comuníquesele a su médico.

El inicio del tratamiento en adultos es de 1 cápsula (50 mg de diacarina) 1 vez al día. La dosis máxima recomendada es de 1 cápsula 2 veces al día (100 mg de diacarina).

Las cápsulas se tomarán enteras, con un poco de líquido, con las comidas principales.

### **Uso en niños**

El uso de **COMINAR** está contraindicado en menores de 15 años.

### **Uso en ancianos**

No se recomienda el uso de **COMINAR** en pacientes mayores de 65 años.

### **Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos**

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

### **Toma conjunta de COMINAR con alimentos y bebidas**

Se aconseja ingerir las cápsulas de **COMINAR** junto con las comidas.

### **Si olvidó tomar COMINAR**

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Continúe el tratamiento con la siguiente dosis a su hora habitual.

## **A tener en cuenta mientras toma COMINAR**

### **Efectos indeseables (adversos)**

Al igual que todos los medicamentos, **COMINAR** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos adversos se clasifican en:

- *Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):* dolor abdominal, deposiciones blandas y diarrea. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, estos efectos secundarios han sido bien tolerados y tienden a desaparecer a las 2-3 semanas de iniciado el tratamiento.
- *Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):* escozor, erupción en la piel y eczema.

Rara vez (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas) aparece una pigmentación de la mucosa del intestino (melanosis cólica).

Dadas las características de la diacereína, en algunos casos, puede aparecer un oscurecimiento o una coloración fuerte de la orina que carece de importancia.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

### **¿Cómo conservar COMINAR?**

- Conservar en su envase original desde 15°C hasta 30°C. Proteger de la humedad.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

### **Presentación**

Envases con 30 y 60 cápsulas.



**Esta especialidad medicinal está libre de gluten.**

**Fecha de última revisión:** Junio de 2017

### **Si ud se aplica dosis mayores de COMINAR de las que debiera**

Si usted ha tomado más **COMINAR** de lo que debe, puede producirse una diarrea muy intensa. Consulte inmediatamente a su médico quien le aconsejará sobre las medidas a adoptar.

En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico.,

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.**

**No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT**

**<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a**

**ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.  
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.  
Certificado N° 47.271  
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.  
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

