

DERCOLINA A® Adultos



SALICILATO DE COLINA 8,720 g
BENZOCAINA 10,000 g
PROSPECTO

Gel (Jalea)

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Fórmula

Cada 100 g de gel contiene: Benzocaina 10,000 g; Salicilato de colina 8,720 g. Excipientes: fosfato monopotásico anhidro 0,869 g, hidroxipropilcelulosa 10,000 g, cloruro de benzalconio 0,010 g, fosfato disódico anhidro 0,188 g, anetol 0,070 g, esencia de menta 0,050 g, sucralosa 0,240 g, polietilenglicol 400 20,000 g, azul patente 0,300 mg, amarillo de quinolina 1,000 mg, alcohol 30,000 g, agua purificada c.s.p. 100,000 g.

Acción Terapéutica: anti-inflamatorio – Analgésico tópico – Anestésico local.

Indicaciones: ulceraciones, heridas, irritaciones de la mucosa bucal (labios, paladar, encías, lengua).

Acción Farmacológica: la acción analgésica-antiinflamatoria de **DERCOLINA A Adultos**, es debida al salicilato de colina. La acción antiinflamatoria del salicilato de colina se sustenta en la actividad del ión salicilato, reconocido AINE; también se describe una acción inhibitoria sobre la hialuronidasa, enzima que hidroliza el ácido hialurónico.

La acción bactericida de **DERCOLINA A Adultos** está expresada por el cloruro de benzalconio compuesto de amonio cuaternario que inhibe el crecimiento bacteriano de gram positivos y gram negativos; se sostiene la hipótesis que la droga interfiere los mecanismos enzimáticos bacterianos, quizás alterando la permeabilidad de la membrana celular.

La acción anestésica de **DERCOLINA A Adultos** se debe a la Benzocaina. Este es un anestésico de acción tópica cuya acción es de inicio rápido (15 a 30 segundos) y de corta duración (15 minutos). Además la concentración alcohólica del producto y su contenido en mentol-anetol, que al producir una sensación de enfriamiento por estimulación de los receptores específicos, provoca un embotamiento superficial de la sensibilidad.

Farmacocinética: la absorción del cloruro de benzalconio y salicilato de colina es virtualmente nula tras la administración tópica en mucosas. La benzocaína no presenta absorción sistémica considerable.

Posología: la aplicación de la jalea, debe efectuarse con un dedo limpio, aplicando la misma con un suave masaje sobre la lesión a tratar. Debe repetirse no más de 4 veces por día.

Contraindicaciones: este producto está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a salicilato, a benzocaína (o anestésicos relacionados como la procaína y butacaína) o a otros componentes del producto.

Este medicamento no debe usarse en niños menores de 12 años.

Advertencias: La benzocaína puede causar una muy rara pero sería condición llamada metahemoglobinemia. Puede ocurrir tanto en niños como adultos La metahemoglobina es una forma de hemoglobina que no se une al oxígeno, provocando signos y síntomas característicos como palidez y coloración azul/grisácea de la piel y uñas, fatiga, cefalea y confusión. Debe ser tratada prontamente, ya que si se retrasa puede causar daño cerebral permanente y también en otros órganos, debido a falta de aporte de oxígeno.

Precauciones: el cloruro de benzalconio produce desestabilización de la capa lipídica y de las membranas epiteliales de la córnea por lo cual debe tenerse especial precaución en evitar el contacto del producto con los ojos.

Asimismo, se debe tener en cuenta la presencia de alcohol en este medicamento.

La ausencia de mejoría luego de varios días de tratamiento deberá hacer reevaluar la conducta terapéutica.

Este producto está indicado para el tratamiento de afecciones de la mucosa oral y no debe ser aplicado a otras áreas del cuerpo.

Interacciones medicamentosas: el cloruro de benzalconio aplicado tópicamente es incompatible con surfactantes aniónicos, sales de plata, sulfato y óxido de zinc, peróxido de hidrógeno y sales de aluminio.

Reacciones Adversas: reacciones de hipersensibilidad a salicilato. Riesgo de irritación en razón de la presencia de alcohol.

El cloruro de benzalconio, utilizado como preservativo en gotas nasales o en soluciones para nebulizar se ha relacionado excepcionalmente con la aparición de rinitis, irritación nasal y broncoespasmo en paciente asmáticos, aunque dichos efectos adversos no se han observado con el uso tópico de la droga. Se han comunicado casos de metahemoglobinemia tras el uso de benzocaína tópica.

Embarazo y lactancia: no se contraindica su uso durante el embarazo y la lactancia.

Sobredosificación: en las condiciones normales de utilización en odontoestomatología no se han reportado efectos por sobredosis. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Presentación: Envases con 20 g.

Fecha de última revisión: Agosto de 2016.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Forma de conservación

- Conservar en su envase original a temperatura inferior a 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 58.039

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**