

DERCOLINA A® Adultos



SALICILATO DE COLINA 8,720 g

BENZOCAINA 10,000 g

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CONSULTE A SU MÉDICO

Gel (Jalea)

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a aplicar **DERCOLINA A Adultos** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada 100 g de gel contiene: Benzocaina 10,000 g; Salicilato de colina 8,720 g. Excipientes: fosfato monopotásico anhidro, hidroxipropilcelulosa, cloruro de benzalconio, fosfato disódico anhidro, anetol, esencia de menta, sucralosa, polietilenglicol 400, azul patente, amarillo de quinolina, alcohol, agua purificada.

¿Qué es DERCOLINA A Adultos y para qué se usa?

DERCOLINA A Adultos es un anti-inflamatorio, analgésico y anestésico tópico para uso en la mucosa oral. Tiene tres componentes básicos: el salicilato de colina que es un antiinflamatorio, el cloruro de benzalconio que tiene la capacidad de destruir gérmenes y la benzocaína, que es anestésico de acción tópica. Se usa para el alivio de la inflamación y el dolor provocada por ulceraciones, heridas e irritaciones del revestimiento de la boca (sobre labios, paladar, encías y lengua).

No use DERCOLINA A Adultos

- Si tiene hipersensibilidad al salicilato.
- Si tiene hipersensibilidad a la benzocaína (o anestésicos relacionados como la procaína y butacaína).
- Si tiene hipersensibilidad a cualquier otro componente de la medicación.

Tenga especial cuidado con DERCOLINA A Adultos

- Evite el contacto con los ojos.
- Tenga en cuenta que este medicamento contiene alcohol en su composición.
- Este medicamento está indicado solo para afecciones de la mucosa oral: no debe ser aplicado en otras áreas del cuerpo.
- Si aparece palidez, coloración azul/grisácea de la piel y uñas, fatiga, dolor de cabeza o confusión: consulte inmediatamente a su médico.

Aplicación simultánea de otros medicamentos

DERCOLINA A Adultos contiene cloruro de benzalconio que aplicado tópicamente es incompatible con surfactantes aniónicos, sales de plata, sulfato y óxido de zinc, peróxido de hidrógeno y sales de aluminio.

Embarazo y lactancia

DERCOLINA A Adultos puede usarse durante el embarazo y la lactancia.

¿Cómo usar DERCOLINA A Adultos?

- La aplicación de la jalea debe efectuarse con un dedo limpio, aplicando la misma con un suave masaje sobre la lesión a tratar.

- La aplicación de la jalea debe repetirse no más de 4 veces por día.

Uso en niños

No debe usarse en niños menores de 12 años de edad.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

No altera la capacidad de conducir vehículos.

A tener en cuenta mientras se aplica DERCOLINA A Adultos

La falta de mejoría luego de varios días de aplicación de **DERCOLINA A Adultos** debe hacer reevaluar la conducta terapéutica. Consulte a su médico.

Efectos indeseables (adversos)

- Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad al salicilato que contiene esta medicación.
- Existe riesgo de irritación en razón de la presencia de alcohol.

El uso de benzocaína puede causar metahemoglobinemia. En esta rara condición la metahemoglobinemia, una forma de hemoglobina, no se une al oxígeno y puede provocar la aparición de palidez y coloración azul/grisácea de la piel y uñas, cansancio, dolor de cabeza y confusión. Si presenta estas manifestaciones, consulte a su médico.

¿Cómo conservar DERCOLINA A Adultos?

- Conservar en su envase original a temperatura inferior a 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 20 g.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Agosto de 2016.

Si Ud. se aplica dosis mayores de DERCOLINA A Adultos de las que debiera

En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas”.**

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT**

**<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.
Certificado N° 58.039
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

