

BLOKIU[®] COX 90 CB

ETORICOXIB 90 MG



Cápsulas blandas

BLOKIU[®] COX 120 CB

ETORICOXIB 120 MG



Cápsulas blandas

INFORMACION PARA EL PACIENTE

CONSULTE A SU MEDICO

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **BLOKIU COX CB** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas

BLOKIU COX 90 CB

Cada cápsula blanda contiene:

Etoricoxib 90,000 mg. Excipientes: polietilenglicol 400, povidona K30, propilenglicol, agua purificada, cascarilla de gelatina (gelatina, glicerina, dióxido de titanio, azul brillante, agua purificada).

BLOKIU COX 120 CB

Cada cápsula blanda contiene:

Etoricoxib 120,000 mg. Excipientes: polietilenglicol 400, povidona K30, propilenglicol, agua purificada, cascarilla de gelatina (gelatina, glicerina, dióxido de titanio, azul brillante, agua purificada).

¿Qué es BLOKIU COX CB y para qué se usa?

BLOKIU COX CB contiene el principio activo Etoricoxib, que pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores selectivos de la enzima ciclooxigenasa 2 (COX2). Éstos pertenecen a una familia de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

BLOKIU COX CB ayuda a reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones y músculos en adultos y adolescentes de 16 años de edad y mayores con artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante (una enfermedad inflamatoria que afecta a la columna vertebral y de las articulaciones largas) y gota.

BLOKIU COX CB también se utiliza para el tratamiento a corto plazo del dolor moderado tras cirugía dental en adultos y adolescentes de 16 años de edad y mayores.

Antes de usar BLOKIU COX CB

No use BLOKIU COX CB si

- es alérgico (hipersensible) a etoricoxib o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- es alérgico a los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), incluyendo la aspirina y los inhibidores de la COX2.
- actualmente tiene una úlcera o hemorragia de estómago o intestino.
- tiene un problema en el funcionamiento del hígado o riñones.
- tiene un problema grave en el funcionamiento de los riñones.
- está o puede estar embarazada o está dando el pecho a su hijo.
- tiene menos de 16 años de edad.
- padece enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o colitis.

- tiene presión arterial alta que no ha sido controlada con el tratamiento (consulte con su médico si no está seguro de si su presión arterial está controlada adecuadamente).
- su médico le ha diagnosticado problemas cardíacos incluyendo insuficiencia cardíaca (de tipo moderado o grave), angina de pecho (dolor torácico) o si ha tenido un infarto cardíaco, revascularización quirúrgica de las arterias del corazón, enfermedad arterial periférica (poca circulación en las piernas o los pies debido a arterias estrechas o bloqueadas) o cualquier tipo de infarto cerebral (incluyendo un accidente cerebrovascular transitorio o un accidente isquémico transitorio).

Etoricoxib puede aumentar ligeramente el riesgo de infarto cardíaco o de infarto cerebral y por esto no debe usarse en aquellos pacientes que ya hayan tenido problemas de corazón o un infarto cerebral.

Si cree que alguno de éstos podría ser su caso, no tome BLOKIUUM COX CB hasta que lo haya consultado con su médico.

Tenga especial cuidado con BLOKIUUM COX CB

Antes de comenzar a tomar BLOKIUUM COX CB, informe a su médico si:

tiene antecedentes de úlceras o hemorragias de estómago o intestino.

- está deshidratado, por ejemplo, como consecuencia de una enfermedad prolongada o por presentar vómitos o diarrea.
- presenta hinchazón debido a retención de líquidos.
- tiene antecedentes de presión arterial alta. BLOKIUUM COX CB puede aumentar la presión arterial en algunas personas, especialmente en dosis altas. Su médico puede requerir controlar su presión arterial durante el tratamiento con BLOKIUUM COX CB.
- tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o cualquier otra forma de enfermedad cardíaca.
- tiene antecedentes de enfermedad de hígado o de riñón.
- está siendo tratado por una infección. BLOKIUUM COX CB puede enmascarar o encubrir la fiebre, que es un signo de infección.
- padece diabetes, colesterol alto o es fumador, ya que esto puede aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca.
- está intentando quedar embarazada.
- es mayor de 65 años.

Toma simultánea de otros medicamentos

Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos incluyendo los adquiridos sin receta (venta libre), vitaminas y suplementos a base de hierbas. BLOKIUUM COX CB puede afectar la forma de actuar de otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en la que actúa BLOKIUUM COX CB.

En particular, informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes medicamentos:

- anticoagulantes (para evitar la formación de coágulos en la sangre), como warfarina o acenocumarol.
- rifampicina (un antibiótico).
- metotrexato (utilizado para suprimir el sistema inmune y en ocasiones usado en la artritis reumatoidea).
- ciclosporina o tacrolimus (utilizados para suprimir el sistema inmune).
- litio (utilizado para tratar algunos tipos de depresión).
- medicamentos utilizados para ayudar a controlar la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca denominados inhibidores de la enzima convertidora de
- angiotensina (IECA) y antagonistas del receptor de angiotensina, por ejemplo, enalapril y ramipril, y losartán y valsartán.
- diuréticos (para aumentar la producción de orina).
- digoxina (para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y el ritmo irregular del corazón).

- minoxidil (para el tratamiento de la presión arterial alta).
- comprimidos o solución oral de salbutamol (para el tratamiento del asma).
- anticonceptivos orales o terapia hormonal de sustitución. La combinación puede aumentar su riesgo de efectos adversos.
- aspirina, el riesgo de úlceras en el estómago es mayor si toma BLOKIU COX CB con aspirina. BLOKIU COX CB puede tomarse con dosis bajas de aspirina.

Si actualmente está tomando dosis bajas de aspirina para prevenir infartos cardíacos o un infarto cerebral, no debe dejar de tomar aspirina hasta que hable con su médico. No tome dosis altas de aspirina y otros medicamentos antiinflamatorios mientras está tomando BLOKIU COX CB.

¿Cómo usar BLOKIU COX CB?

Siempre tome BLOKIU COX CB exactamente como se lo indique su médico. Si no está seguro debe consultar con su médico. No tome más de la dosis recomendada para su enfermedad. Es importante que utilice la dosis más baja que controla su dolor. No debe tomar BLOKIU COX CB más tiempo del necesario. Esto se debe a que el riesgo de infarto cardíaco e infarto cerebral podría aumentar después de un tratamiento prolongado, especialmente con dosis altas.

Hay diferentes dosis disponibles para este medicamento, y dependiendo de su enfermedad, su médico le indicará la dosis que sea adecuada para usted.

Como posología orientativa se recomienda:

Artritis reumatoidea

La dosis recomendada es de 90 mg de Etoricoxib una vez al día.

Espondilitis anquilosante

La dosis recomendada es de 90 mg de Etoricoxib una vez al día. Etoricoxib sólo debe utilizarse durante el período de dolor agudo.

Gota

La dosis recomendada es de 120 mg de Etoricoxib una vez al día que sólo debe utilizarse durante el período de dolor agudo, limitada a un máximo de 8 días de tratamiento.

Dolor posoperatorio tras cirugía dental

La dosis recomendada es de 90 mg de Etoricoxib una vez al día, limitada a un máximo de 3 días de tratamiento.

Embarazo y Lactancia

BLOKIU COX CB no debe tomarse durante el embarazo. No tome BLOKIU COX CB si está embarazada, cree que podría estar embarazada o si tiene previsto o está intentando quedar embarazada. Si queda embarazada, deje de tomar BLOKIU COX CB y consulte a su médico.

Se desconoce si BLOKIU COX CB se elimina por la leche materna. Si está amamantando o tiene previsto hacerlo, consulte a su médico antes de tomar BLOKIU COX CB. Si está utilizando BLOKIU COX CB, no debe dar el pecho a su bebé. Su médico decidirá si debe interrumpir la lactancia o bien interrumpir el tratamiento con BLOKIU COX CB.

Uso en niños y adolescentes

Niños o adolescentes menores de 16 años de edad no deben tomar BLOKIU COX CB.

Pacientes mayores de 65 años

No es necesario un ajuste de dosis en pacientes mayores de 65 años. Se debe tener precaución en pacientes de edad avanzada.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos y uso de maquinaria

En algunos pacientes que toman BLOKIUUM COX CB, se han comunicado mareos y somnolencia. No conduzca ni utilice herramientas o maquinarias que requieran atención si experimenta mareos o somnolencia.

Toma conjunta de BLOKIUUM COX CB con alimentos y bebidas

BLOKIUUM COX CB se administra por vía oral. Se debe tomar una vez al día con o sin alimentos. El comienzo del efecto de BLOKIUUM COX CB puede ser más rápido si se toma sin alimentos.

Uso apropiado del medicamento BLOKIUUM COX CB

Si se olvidó de tomar BLOKIUUM COX CB

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde y tome la siguiente dosis en el horario habitual.

A tener en cuenta mientras toma BLOKIUUM COX CB

Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos, Etoricoxib puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los experimenten.

Si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos, deje de tomar BLOKIUUM COX CB y póngase en contacto con su médico o acuda al hospital más cercano de inmediato, ya que puede necesitar atención médica urgente:

- dificultad para respirar, dolor torácico o hinchazón de los tobillos, piernas y/o pies.
- color amarillento de la piel o el blanco de los ojos (ictericia). Éstos son signos de problemas en la función del hígado.
- dolor de estómago intenso o continuo o heces de color negro.
- una reacción alérgica, que puede incluir problemas en la piel como úlceras o formación de ampollas, o hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta que puede causar dificultad al respirar.

Los siguientes efectos adversos pueden producirse durante el tratamiento con Etoricoxib:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

- dolor abdominal.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- osteítis alveolar (inflamación y dolor tras la extracción de un diente).
- hinchazón (edema) de las piernas y/o los pies debido a la retención de líquidos (edema).
- mareo, dolor de cabeza.
- palpitaciones (latido del corazón rápido o irregular), ritmo cardíaco irregular (arritmia).
- presión arterial elevada.
- dificultad para respirar (broncoespasmo).
- constipación, gases, gastritis (inflamación de la capa interna del estómago), ardor o sensación de acidez en el estómago, diarrea, indigestión (dispepsia) /molestia de estómago, náuseas, vómitos, inflamación del esófago, úlceras en la boca.
- aumento en las enzimas producidas por el hígado AST y ALT. Esto se ve en los análisis de sangre para controlar el funcionamiento del hígado.
- hematomas (moretones).
- debilidad y fatiga, enfermedad tipo gripe.

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- gastroenteritis (inflamación del tracto gastrointestinal, que afecta tanto al estómago como al intestino delgado), resfrío, infección urinaria.
- número disminuido de glóbulos rojos (anemia), número disminuido de glóbulos blancos (encargados de la defensa frente a infecciones), descenso de plaquetas (encargadas de formar coágulos que evitan el sangrado).
- hipersensibilidad (reacción alérgica, incluyendo urticaria que puede ser lo suficientemente grave para requerir atención médica inmediata).
- aumento o disminución del apetito, aumento de peso.
- ansiedad, depresión, disminución de la agudeza mental; ver, sentir u oír cosas que no existen (alucinaciones).
- alteración del gusto, incapacidad para dormir, entumecimiento u hormigueo, somnolencia.
- visión borrosa, irritación y enrojecimiento ocular (conjuntivitis).
- sensación de ruido en los oídos, vértigo (sensación de giro estando parado).
- ritmo cardíaco anómalo (fibrilación auricular), frecuencia cardíaca rápida, insuficiencia cardíaca, sensación de tensión, presión o pesadez en el pecho (angina de pecho), infarto cardíaco.
- enrojecimiento, accidente cerebrovascular, trastorno transitorio de la circulación en alguna región cerebral, aumento grave de la presión arterial, inflamación de los vasos sanguíneos.
- tos, sensación de dificultad para respirar, sangrado nasal.
- distensión del abdomen, cambios en los hábitos del movimiento de su intestino, sequedad de boca, úlcera de estómago o intestino que puede llegar a ser grave y puede producir sangrado o perforación, síndrome de colon irritable, inflamación del páncreas.
- hinchazón de la cara, erupción o picazón en la piel, enrojecimiento de la piel.
- calambre / espasmo muscular, dolor / rigidez muscular.
- niveles elevados de proteínas en orina, cambios en los análisis de sangre o de orina relacionados con el funcionamiento de sus riñones, problemas renales graves (fallo / insuficiencia).
- aumento del potasio, ácido úrico o creatinfosfoquinasa en sangre.
- dolor torácico.

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas):

- angioedema (reacción alérgica con hinchazón de la cara, labios, lengua, y/o garganta que puede causar dificultad para respirar o tragar, que puede ser lo suficientemente grave para requerir atención médica inmediata), reacciones anafilácticas / anafilactoides incluyendo shock (reacción alérgica grave que requiere atención médica inmediata).
- confusión, inquietud.
- problemas en el funcionamiento del hígado (hepatitis o insuficiencia hepática).
- alteración del hígado, color amarillento de la piel y/o blanco de los ojos (ictericia).
- niveles bajos de sodio en sangre.
- reacciones alérgicas cutáneas graves.

¿Cómo conservar BLOKIU COX CB?

- Conservar en su envase original en lugar seco, entre 15°C y 25°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

BLOKIU COX 90 CB: Envases con 10 y 30 cápsulas blandas.

BLOKIU COX 120 CB: Envases con 10 cápsulas blandas.

Fecha de última revisión: Febrero de 2026.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Si Ud. toma dosis mayores de BLOKIU COX CB de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 58.320

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Elaborado en: Puente del Inca N°2.450. Parcela 35, POLO INDUSTRIAL EZEIZA, Localidad de Carlos Spegazzini, Partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

