

MEMANTINA CLORHIDRATO 14 mg;
DONEPECILO CLORHIDRATO 10 mg
MEMANTINA CLORHIDRATO 28 mg;
DONEPECILO CLORHIDRATO 10 mg
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
CONSULTE A SU MEDICO

Cápsulas de liberación prolongada

Venta bajo receta archivada

Industria Argentina

Lea esta Información para el Paciente antes de comenzar a tomar **LIRPAN PLUS** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas

LIRPAN PLUS 14/10 mg

Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Memantina clorhidrato 14 mg; Donepecilo clorhidrato 10 mg. Excipientes: *Núcleo de microtableta*: hidroxipropilmetilcelulosa K10; hidroxipropilcelulosa; fosfato tricálcico; dióxido de silicio coloidal; talco; estearato de magnesio. *Cubierta de microtableta*: Opadry EC (etilcelulosa; talco; hidroxipropilmetilcelulosa; trietilcitrato); hidroxipropilmetilcelulosa E6. *Granulado*: almidón de maíz; povidona K30; celulosa microcristalina; croscarmelosa sodica; talco; estearato de magnesio. *Cápsula*: colorante amarillo ocaso (CI 15985); colorante rojo allura FD&C n° 40 (CI 16035); dióxido de titanio; gelatina.

LIRPAN PLUS 28/10 mg

Cada cápsula de liberación prolongada contiene: Memantina clorhidrato 28 mg; Donepecilo clorhidrato 10 mg. Excipientes: *Núcleo de microtableta*: hidroxipropilmetilcelulosa K100; hidroxipropilcelulosa; fosfato tricalcico; dióxido de silicio coloidal; talco; estearato de magnesio. *Cubierta de microtableta*: Opadry EC (etilcelulosa; talco; hidroxipropilmetilcelulosa; trietilcitrato); hidroxipropilmetilcelulosa E6. *Granulado*: almidón de maíz; povidona K30; celulosa microcristalina; croscarmelosa sódica; talco; estearato de magnesio. *Cápsula*: azul brillante; eritrosina E127; colorante amaranto (CI 16185); dióxido de titanio; gelatina.

¿Qué es LIRPAN PLUS y para qué se usa?

- **LIRPAN PLUS** es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar la demencia de moderada a grave en personas con Enfermedad de Alzheimer. **LIRPAN PLUS** contiene 2 medicamentos, memantina clorhidrato, un antagonista de los receptores NMDA, y donepecilo clorhidrato, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. **LIRPAN PLUS** está destinado a personas que pueden recibir determinadas dosis de memantina clorhidrato y donepecilo clorhidrato.
- No se sabe si **LIRPAN PLUS** es seguro y eficaz en los niños.

No tome LIRPAN PLUS si

- Tiene alergia a la memantina clorhidrato, al donepecilo clorhidrato, a medicamentos que contengan piperidinas o a cualquiera de los ingredientes de **LIRPAN PLUS**.

Antes de usar LIRPAN PLUS

Antes de recibir **LIRPAN PLUS**, cuénteles a su médico acerca de todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene problemas cardíacos, incluido un pulso irregular, lento o rápido.
 - Si ha tenido una afección cardíaca (como latidos cardíacos irregulares o muy lentos, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio) una afección cardíaca denominada «prolongación del intervalo QT» o antecedentes de determinados ritmos cardíacos anómalos llamados torsade de pointes o si alguien de su familia presenta «prolongación del intervalo QT».
 - Tiene asma o problemas respiratorios.
 - Tiene convulsiones.
 - Tiene úlceras estomacales.
 - Tiene problemas renales o en la vejiga.
 - Tiene problemas hepáticos.
 - Tiene programados procedimientos quirúrgicos, odontológicos o médicos de otro tipo donde se podría utilizar anestesia.
 - Tiene alguna otra afección médica.
 - Niveles bajos de magnesio o potasio en la sangre.
 - Está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si **LIRPAN PLUS** puede causarle daño al feto;
 - Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si **LIRPAN PLUS** pasa a la leche materna.
- Hable con su médico sobre la mejor forma de alimentar a su bebé si toma **LIRPAN PLUS**.

Dígale a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y sin ella, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Sepa los medicamentos que toma. Haga una lista con dichos medicamentos y muéstresela a su médico o farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

LIRPAN PLUS contiene Eritrosina como colorante.

Toma simultánea de otros medicamentos

En especial, es importante que informe a su médico si está tomando alguno de los siguientes tipos de medicamentos:

- Medicamentos para problemas del ritmo cardíaco, por ejemplo, amiodarona o sotalol.
- Medicamentos para la depresión, por ejemplo, citalopram, escitalopram, amitriptilina, fluoxetina.
- Medicamentos para la psicosis, p. ej. pimozida, sertindole o ziprasidona.
- Medicamentos para infecciones bacterianas, por ejemplo, claritromicina, eritromicina, levofloxacino, moxifloxacino, rifampicina.
- Medicamentos antifúngicos, como el ketoconazol.
- Otros medicamentos contra la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, galantamina.
- Analgésicos o tratamiento de la artritis, por ejemplo, aspirina, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como ibuprofeno o diclofenaco sódico.
- Medicamentos anticolinérgicos, p. ej. tolterodina.
- Anticonvulsivos, p. ej., fenitoína, carbamazepina.
- Medicación para una enfermedad cardíaca, por ejemplo, quinidina, betabloqueantes (propranolol y atenolol)
- Relajantes musculares, p. ej., diazepam, succinilcolina.
- Anestésico general.
- Medicamentos obtenidos sin receta, por ejemplo, remedios a base de plantas.

¿Cómo usar LIRPAN PLUS?

- Tome **LIRPAN PLUS** exactamente como se lo indique su médico.
- No cambie su dosis ni deje de tomar **LIRPAN PLUS** sin hablar con su médico.
- Tome **LIRPAN PLUS** por boca una vez todas las noches antes de acostarse.
- Las cápsulas de **LIRPAN PLUS** se deben tragar enteras. No se deben abrir, masticar ni triturar.
- Si omite una dosis, tome **LIRPAN PLUS** con su siguiente dosis programada. No tome 2 dosis de **LIRPAN PLUS** al mismo tiempo.

Embarazo y lactancia

- *Embarazo:* no existen estudios adecuados ni bien controlados o sus principios activos en mujeres embarazadas. **LIRPAN PLUS** debe utilizarse durante el embarazo únicamente si el posible beneficio justifica el potencial riesgo para el feto.
- *Lactancia:* se desconoce si la memantina o el donepecilo se excretan en la leche humana. Como muchos fármacos se excretan en la leche materna, se debe tener precaución cuando se administre **LIRPAN PLUS** a madres en período de lactancia.

Uso en niños

No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de **LIRPAN PLUS** en pacientes pediátricos.

Uso en mayores de 65 años

No se han observado diferencias clínicas importantes en eficacia y seguridad con el uso de **LIRPAN PLUS** en pacientes ≥ 65 años y en aquellos < 65 años.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

LIRPAN PLUS puede modificar la capacidad de reacción en la conducción de vehículos o manipulación de maquinarias.

Toma conjunta de LIRPAN PLUS con alimentos y bebidas

LIRPAN PLUS puede tomarse con o sin alimentos.

Uso apropiado del medicamento LIRPAN PLUS

Se olvidó de tomar LIRPAN PLUS

Si omite una dosis, tome **LIRPAN PLUS** con su siguiente dosis programada. No tome 2 dosis de **LIRPAN PLUS** al mismo tiempo.

A tener en cuenta mientras toma LIRPAN PLUS

La eliminación de memantina, un componente de **LIRPAN PLUS**, se reduce en forma marcada con la alcalinización de la orina (pH de 8). La alcalinización de la orina se puede ver afectada por la dieta, medicamentos o condiciones clínicas. Consulte a su médico.

Se ha reportado la ocurrencia muy rara de unas reacciones adversas serias llamadas rabdomiólisis y síndrome neuroléptico maligno asociadas a la administración de **LIRPAN PLUS**.

Si usted utiliza este medicamento y presenta orina de color oscuro o rojo, disminución de la producción de orina, debilidad, rigidez o dolor muscular, fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria, alteración de la presión arterial, sudoración abundante y/o alteraciones del estado de conciencia, deje de usar **LIRPAN PLUS** y consulte a su médico inmediatamente.

Si usted está al cuidado de un paciente que recibe este medicamento, esté atento a la aparición de los síntomas antes mencionados. En caso de presentarse, suspenda el uso de **LIRPAN PLUS** y consulte a su médico inmediatamente.

Efectos indeseables (adversos)

LIRPAN PLUS puede provocar efectos secundarios serios, incluidos:

- *Problemas musculares si necesita anestesia.*
- *Pulso lento y desmayos:* esto sucede con mayor frecuencia en personas con problemas cardíacos. Llame al médico de inmediato si el paciente se desmaya mientras toma **LIRPAN PLUS**.
- *Más ácido estomacal:* esto aumenta las probabilidades de que se produzcan úlceras y hemorragias, en particular al tomar **LIRPAN PLUS**. El riesgo es mayor en pacientes que tuvieron úlceras, o toman aspirina u otros AINE.
- *Náuseas y vómitos.*
- *Dificultad para orinar.*
- *Convulsiones.*
- *Empeoramiento de problemas respiratorios* en personas con asma u otras enfermedades pulmonares.

Los efectos secundarios más frecuentes de la memantina clorhidrato incluyen:

- Dolor de cabeza;
- Diarrea;
- Mareos.

Los efectos secundarios más frecuentes del donepecilo incluyen

- diarrea;
- falta de deseo de comer (anorexia);
- hematomas.

- Trastornos musculoesqueléticos

Frecuencia muy rara (menos de 1 cada 10.000 personas): rabdomiólisis.

- Trastornos del sistema nervioso

Frecuencia muy rara (menos de 1 cada 10.000 personas): síndrome neuroléptico maligno.

- Trastornos cardiovasculares

Frecuencia no conocida

Cambios en la actividad cardíaca que pueden observarse en un electrocardiograma (ECG) denominados «prolongación del intervalo QT».

Latido cardíaco rápido e irregular, desmayos que pueden ser síntomas de un trastorno potencialmente mortal conocido como torsade de pointes.

Infórmele a su médico si tiene algún efecto secundario que le molesta o no desaparece. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de **LIRPAN PLUS**. Para obtener más información, consulte a su médico o a su farmacéutico.

¿Cómo conservar LIRPAN PLUS?

- Conservar en su envase original desde 15 °C hasta 30° C. Al abrigo de la luz.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentaciones

Envases con 30 cápsulas de liberación prolongada.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Noviembre de 2023.

Si Ud. toma dosis mayores de LIRPAN PLUS de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT**

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234”

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N ° 58.409

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

