

## Venta Bajo Receta

Industria Argentina

## Fórmula

Cada 100 g de DERCOLINA jalea (sabor Menta) contiene: Colina Salicilato 8,720 g; Benzalconio Cloruro 0,010 g; Excipientes: hidroxipropilcelulosa 2,800 g; glicerina 15,000 g; fosfato monopotásico anhidro 0,515 g; fosfato disódico anhidro 0,188 g; esencia de menta 0,050 g; anetol 0,070 g; sucralosa 0,080 g; alcohol 41,000 g; agua purificada c.s.p. 100,000 g.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

Anti-inflamatorio – Analgésico tópico.

**Código ATC:** N02BA03

## INDICACIONES

Ulceraciones, heridas, irritaciones de la mucosa bucal (labios, paladar, encías, lengua).

## ACCIÓN FARMACOLÓGICA

La acción analgésica-antiinflamatoria de **DERCOLINA**, es debida al salicilato de colina. La acción antiinflamatoria del salicilato de colina se sustenta en la actividad del ion salicilato, reconocido AINE; también se describe una acción inhibitoria sobre la hialuronidasa, enzima que hidroliza el ácido hialurónico.

La acción bactericida de **DERCOLINA** está expresada por el cloruro de benzalconio compuesto de amonio cuaternario que inhibe el crecimiento bacteriano de Gram positivos y Gram negativos; se sostiene la hipótesis de que la droga interfiere los mecanismos enzimáticos bacterianos, quizás alterando la permeabilidad de la membrana celular.

La suave acción anestésica se debe a la concentración alcohólica del producto y su contenido en mentol-anetol, que, al producir una sensación de enfriamiento por estimulación de los receptores específicos, provoca un embotamiento superficial de la sensibilidad.

## FARMACOCINÉTICA

La absorción del cloruro de benzalconio y salicilato de colina es virtualmente nula tras la administración tópica en mucosas.

## POSOLOGÍA

La aplicación de la jalea debe efectuarse con un dedo limpio, aplicando la misma con un suave masaje sobre la lesión a tratar.

Debe repetirse la administración 3 o 4 veces por día.

## CONTRAINDICACIONES

Este producto está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al salicilato o cualquiera de los componentes del producto.

Este medicamento no debe usarse en niños menores de tres años.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El cloruro de benzalconio produce desestabilización de la capa lipídica y de las membranas epiteliales de la córnea por lo cual debe tenerse especial precaución en evitar el contacto del producto con los ojos.

Asimismo, se debe tener en cuenta la presencia de alcohol en este medicamento.  
La ausencia de mejoría luego de varios días de tratamiento deberá hacer reevaluar la conducta terapéutica.

#### Embarazo y lactancia

No está contraindicado su uso durante el embarazo y la lactancia.

#### Uso en pediatría

No usar en niños menores de tres años.

#### Interacciones medicamentosas

El cloruro de benzalconio aplicado tópicamente es incompatible con surfactantes aniónicos, sales de plata, sulfato y óxido de zinc, peróxido de hidrógeno y sales de aluminio.

#### **REACCIONES ADVERSAS**

Reacciones de hipersensibilidad al salicilato. Riesgo de irritación en razón de la presencia de alcohol.  
El cloruro de benzalconio, utilizado como preservativo en gotas nasales o en soluciones para nebulizar se ha relacionado excepcionalmente con la aparición de rinitis, irritación nasal y broncoespasmo en paciente asmáticos, aunque dichos efectos adversos no se han observado con el uso tópico de la droga.

#### **SOBREDOSIFICACIÓN**

En las condiciones normales de utilización en odontoestomatología no se han reportado efectos por sobredosis. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

#### **PRESENTACIÓN**

Pomo de 20 g.

**Fecha de última revisión:** Mayo de 2019.

**Esta especialidad medicinal está libre de gluten.**



#### **FORMA DE CONSERVACIÓN**

- Conservar en su envase original en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15°C y 30 °C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 33.185

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 CASASCO