

FACTOR® BB



OXIDO DE ZINC 15 g; VITAMINA A PALMITATO 600.000 UI;
ACIDO BORICO 2 g
PROSPECTO PARA EL USUARIO

Pomada

Vía de Administración: Tópica

Venta Libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO, conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.

¿QUÉ CONTIENE FACTOR BB?

Cada 100 gramos contienen:

Ingredientes activos: Óxido de zinc 15,000 gramos; Vitamina A palmitato 600.000 Unidades Internacionales; Ácido bórico 2,000 gramos. Ingredientes inactivos: vitamina E acetato; vaselina sólida; alcohol cetosteárilico / eter polioxil 20 cetosteárilico (7:3); monoestearato de glicerilo; butilhidroxitolueno; vaselina líquida.

ACCIÓN

Cicatrizante, antiséptica y regeneradora de la piel.

¿PARA QUÉ SE USA FACTOR BB?

Se usa para el alivio local de las raspaduras, dermatitis, enfermedades inflamatorias superficiales que afectan principalmente la capa más externa de la piel (irritaciones menores).

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR FACTOR BB?

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes de la fórmula.

Si Ud. Está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE UTILIZAR FACTOR BB?

Dada la sensibilidad de la piel o si las lesiones son muy extensas se deben evitar las compresas o la cobertura parcial o total con materiales impermeables o el exceso de aplicaciones dado que se pueden presentar efectos de sobredosificación por reabsorción de la vitamina A.

No administrar en menores de 2 años sin supervisión médica.

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o en período de lactancia, consulte a un médico antes de usar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ UTILIZANDO FACTOR BB?

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Debido a que existe cierta absorción a través de la piel de la Vitamina A, los riesgos de sufrir efectos indeseables solamente aumentan cuando la superficie sobre la que se aplica es extensa, se emplean vendas, la piel está dañada (particularmente quemada) o se trata de mucosas (capas húmedas que recubren una cavidad abierta al exterior o un conducto del cuerpo; ej. mucosa

nasal). Debe tenerse en cuenta que en caso de uso prolongado y de aplicación en zonas extensas y con la piel muy dañada, si bien no es lo habitual, podrían aparecer síntomas de hipervitaminosis (trastornos provocados por el exceso de una vitamina) como la que se observa con la administración oral de Vitamina A.

¿CÓMO SE USA FACTOR BB?

Aplicar sobre la zona a tratar 2 a 3 veces por día, según se requiera.

No colocar más de 3 veces por día, si los síntomas no mejoran en 7 días o empeoran consultar inmediatamente con su médico.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI COLOQUÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA INGESTA ACCIDENTAL O SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

- Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
- Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese al siguiente teléfono:

ANMAT Responde: 0800 333 1234

Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Presentaciones:

Envases conteniendo 50 g y 100 g.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten



FORMA DE CONSERVACIÓN:

- Conservar en su envase original a temperatura ambiente hasta 25°C. Eventualmente, puede presentarse una pequeña separación de líquido que proviene de los componentes de la pomada, lo cual no afecta la calidad del producto.

Fecha de última revisión: Abril de 2025.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 60.372

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

