


110 mm


DERCOLINA® A


GEL

**SALICILATO DE COLINA
BENZOCAINA**

 Venta Bajo Receta
Industria Argentina

**INFORMACION PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MEDICO -**

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a aplicar DERCOLINA A Adultos y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula: cada 100 g de Gel DERCOLINA A Adultos contiene: SALICILATO DE COLINA 8,720 g, BENZOCAINA 10,000 g. Excipientes: Fosfato monopotásico anhidro; Hidroxipropilcelulosa; Cloruro de benzalconio; Fosfato disódico anhidro; Anetol; Esencia de menta; Sucralosa; Polietilenglicol 400; Azul patente; Amarillo de quinolina; Alcohol; Agua purificada.

¿Qué es DERCOLINA A Adultos y para qué se usa?

DERCOLINA A Adultos es un anti-inflamatorio, analgésico y anestésico tópico para uso en la mucosa oral. Tiene tres componentes básicos: el salicilato de colina que es un antiinflamatorio, el cloruro de benzalconio que tiene la capacidad de destruir gérmenes y la benzocaína, que es anestésico de acción tópica. Se usa para el alivio de la inflamación y el dolor provocada por ulceraciones, heridas e irritaciones del revestimiento de la boca (sobre labios, paladar, encías y lengua).

No use DERCOLINA A Adultos

- Si tiene hipersensibilidad al salicilato.
- Si tiene hipersensibilidad a la benzocaína (o anestésicos relacionados como la procaína y butacaína).
- Si tiene hipersensibilidad a cualquier otro componente de la medicación.

Tenga especial cuidado con DERCOLINA A Adultos

- Evite el contacto con los ojos.
- Tenga en cuenta que este medicamento contiene alcohol en su composición.
- Este medicamento está indicado solo para afecciones de la mucosa oral: no debe ser aplicado en otras áreas del cuerpo.
- Si aparece palidez, coloración azul/grisácea de la piel y uñas, fatiga, dolor de cabeza o confusión: consulte inmediatamente a su médico.

Aplicación simultánea de otros medicamentos

DERCOLINA A Adultos contiene cloruro de benzalconio que aplicado tópicamente es incompatible con surfactantes aniónicos, sales de plata, sulfato y óxido de zinc, peróxido de hidrógeno y sales de aluminio.

Embarazo y lactancia

DERCOLINA A Adultos puede usarse durante el embarazo y la lactancia.

¿Cómo usar DERCOLINA A Adultos?


- La aplicación de la jalea debe efectuarse con un dedo limpio, aplicando la misma con un suave masaje sobre la lesión a tratar.
- La aplicación de la jalea debe repetirse no más de 4 veces por día.



4001

150 mm

110 mm


**Cortar el extremo
de la cánula y aplicar**
Uso en niños

No debe usarse en niños menores de 12 años de edad.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

No altera la capacidad de conducir vehículos.

A tener en cuenta mientras se aplica DERCOLINA A Adultos

La falta de mejoría luego de varios días de aplicación de DERCOLINA A Adultos debe hacer reevaluar la conducta terapéutica. Consulte a su médico.

Efectos indeseables (adversos)

- Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad al salicilato que contiene esta medicación.
- Existe riesgo de irritación en razón de la presencia de alcohol.

El uso de benzocaína puede causar metahemoglobinemia. En esta rara condición la metahemo-globinemia, una forma de hemoglobina, no se une al oxígeno y puede provocar la aparición de palidez y coloración azul/grisácea de la piel y uñas, cansancio, dolor de cabeza y confusión. Si presenta estas manifestaciones, consulte a su médico.

¿Cómo conservar DERCOLINA A Adultos?

- Conservar a temperatura inferior a 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 20 g.

Si Ud. se aplica dosis mayores de DERCOLINA A Adultos de las que debiera

En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: - Hospital A, Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777. - Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. - Opativamente otros Centros de Intoxicaciones.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas". "Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT"

<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION. Certificado N°58.039
Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
E-3673-01 / D4001 / Act. 10/2019

CASASCO


4001

150 mm