200 mm

150 mm

6112

LISUNIX®

FAMPRIDINA 10 mg.

Comprimidos Recubiertos de Liberación Prolongada

Industria Argentina

Venta Bajo Receta Archivada

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
CONSULTE A SU MÉDICO

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar LISUNIX (Fampridina) y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información.
Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula
Cada comprimido recubierto de liberación prolongada de Lisunix contiene: Fampridina 10,00 mg; Excipientes: celulosa microcristalina; hidroxipropilmetilcelulosa K100; hidroxipropilmetilcelulosa E5; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; polietilenglicol 6000; hidroxipropilmetilcelulosa E15; talco; dióxido de titanio; povidona K30.

¿Qué es LISUNIX (Fampridina) y para qué se usa?
LISUNIX (Fampridina) contiene el principio activo fampridina, que pertenece a un grupo de medicamentos llamados bloqueantes de los canales de potasio. Actúan frenando la salida de potasio de las células nerviosas que están dañadas por la Esclerosis Múltiple. Se cree que este medicamento actúa dejando que las señales pasen por el nervio de forma mas adecuada, lo que perite caminar mejor.
LISUNIX (Fampridina) es un medicamento que se utiliza para mejorar la marcha en adultos (18 años o mayores) con Esclerosis Múltiple, que presentan discapacidad en la marcha.
En la Esclerosis Múltiple, la inflamación destruye el recubrimiento protector de los nervios, lo que da lugar a la debilidad muscular, rigidez muscular y dificultad para caminar.

Antes de usar LISUNIX (Fampridina)
No use LISUNIX (Fampridina) si
Si es alérgico a fampridina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
Si tiene crisis epilépticas o alguna vez ha tenido una crisis epiléptica (también) llamado ataque convulsivo o convulsión).
Si tiene problemas de riñón.
Si toma un medicamento que se llama cimetidina.
Si toma algún otro medicamento que contiene fampridina. Podría aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos graves.
Informe a su médico y no tome LISUNIX (Fampridina) si alguna de estas situaciones es aplicable a su caso.

Advertencias y Precauciones
Tenga especial cuidado con LISUNIX (Fampridina)
Si tiene palpitaciones (si nota su latido cardíaco).
Si es propenso a las infecciones.
Si utiliza algún elemento de ayuda para caminar, como por ejemplo un bastón, deberá seguir utilizándolo según sea necesario. Este medicamento puede hacerle sentir mareado o sin equilibrio llevando a un aumento del riesgo de caídas.
Si tiene algún factor de riesgo o esta tomando algún medicamento que afecte el riesgo de sufrir crisis epilépticas.
Informe a su médico antes de tomar LISUNIX (Fampridina) si alguna de estas situaciones es aplicable en su caso.

6112

200 mm

150 mm

6112

Si Ud. toma dosis mayores de LISUNIX (Fampridina) de las que debiera
Los efectos adversos frente a altas dosis de fampridina incluyen confusión, crisis epilépticas, estado epiléptico, movimientos involuntarios. Otros efectos adversos con altas dosis incluyen casos de arritmias cardíacas. También puede generarse hipertensión.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas".
Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234"

Dirección Técnica: Dr. Alejandro. D. Santarelli - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación. Certificado N° 59.628.
Laboratorios CASASCO S.A.I.C. - Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

E-5776-01 / D6112/ Act.: 07/2023

CASASCO

Toma simultánea de otros medicamentos
Informe a su médico si esta utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.
No utilice LISUNIX (Fampridina) si está utilizando otros medicamentos
Que contienen fampridina.
Que afecta a los riñones: su médico tendrá especial cuidado si recibe fampridina al mismo tiempo que otro medicamento que pueda afectar a la eliminación de otros medicamentos por parte de los riñones, por ejemplo, carvedilol, propanolol y metformina.

¿Cómo usar LISUNIX (Fampridina)?
Tome LISUNIX (Fampridina) exactamente como se prescribe. Solo puede obtenerse LISUNIX (Fampridina) bajo la supervisión de médicos con experiencia en Esclerosis Múltiple.
Su médico le recetara inicialmente tratamiento para 2 a 4 semanas. Después de este periodo de 2 a 4 semanas, volverá a evaluar el tratamiento.
Tome un comprimido por la mañana y un comprimido por la noche.
No tome mas de dos comprimidos en un día.
Debe dejar transcurrir por lo menos 12 horas entre cada comprimido.
No tome los comprimidos con una frecuencia mayor que cada 12 horas.
Tome el comprimido entero, con agua.
No debe dividir, triturar, disolver, chupar o masticar el comprimido. Podrá aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos.

Embarazo y lactancia
Si esta embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. No se recomienda utilizar LISUNIX (Fampridina) durante el embarazo.
El médico evaluara el beneficio del tratamiento con LISUNIX (Fampridina) para usted frente al riesgo para el bebe.
Debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento con este medicamento.

Uso en niños
No administre LISUNIX (Fampridina) a niños o adolescentes menos de 18 años.

Uso en ancianos
Antes de comenzar el tratamiento y durante el mismo, el médico puede comprobar que sus riñones funcionen correctamente.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos
LISUNIX (Fampridina) puede afectar a la capacidad de las personas para conducir y utilizar máquinas, ya que puede causar mareos. Asegúrese de que a usted no le afecte antes de comenzar a conducir o utilizar maquinas.

Toma conjunta de LISUNIX (Fampridina) con alimentos y bebidas
LISUNIX (Fampridina) se debe tomar sin alimentos, con el estómago vacío.

Uso apropiado del medicamento LISUNIX (Fampridina)
Si toma más LISUNIX (Fampridina) del que debe
Si ha tomado mas comprimidos de los que debía, contacte a su médico inmediatamente.
Si acude al médico, lleve la caja de LISUNIX (Fampridina) con usted.
Si sufre una sobredosis podrá notar sudoración, temblores (pequeñas sacudidas), confusión, amnesia (perdida de la memoria) y crisis epiléptica (ataques).
También podrá notar otros efectos no mencionados aquí.

Si se olvidó de tomar LISUNIX (Fampridina)
No tome una dosis doble (dos comprimidos a la vez) para compensar las dosis olvidadas. Contacte tan pronto como pueda con su médico.
SIEMPRE deben pasar 12 horas entre cada comprimido.
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

A tener en cuenta mientras toma LISUNIX (Fampridina)
Efectos indeseables (adversos)
Al igual que todos los medicamentos, LISUNIX (Fampridina) puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Si tiene una crisis epiléptica, deje de tomar LISUNIX (Fampridina) e informe a su médico inmediatamente.
Si experimenta uno o mas de los siguientes síntomas de hipersensibilidad: hinchazón de cara, boca, labios, garganta o lengua, enrojecimiento o picazón de la piel, opresión en el pecho y problemas respiratorios, deje de tomar LISUNIX (Fampridina) y acuda a su médico inmediatamente.
Los efectos adversos pueden ocurrir con ciertas frecuencias, que se definen de la siguiente manera:
Muy frecuentes: pueden afectar a mas de 1 de cada 10 pacientes.
Frecuentes: pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes.
Poco frecuentes: que pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes.
Informe inmediatamente a su medico si nota alguno de los siguientes efectos adversos, ya que pueden necesitar tratamiento médico urgente:

Efectos adversos muy frecuentes
Infección en vías urinarias.

Efectos adversos frecuentes
Falta de equilibrio
Mareos
Dolor de cabeza
Sensación de debilidad y cansancio
Dificultad para dormir
Ansiedad
Temblores (pequeñas sacudidas)
Entumecimiento u hormigueo en la piel
Dolor de garganta
Dificultad para respirar (falta de aliento)
Náuseas
Vómitos
Estreñimiento
Malestar de estomago
Dolor de espalda
Sensación de latidos cardiacos (palpitaciones)

Efectos adversos poco frecuentes
Crisis epiléptica
Hipersensibilidad (reacción alérgica)
Empeoramiento del dolor en el nervio facial (neuralgia del trigémino)
Ritmo cardíaco rápido (taquicardia)
Si experimenta cualquier otro tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en esta guía.

¿Cómo conservar LISUNIX (Fampridina)?
- Conservar entre 15 y 30° C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten. Sin T.A.C.C.

Presentación
Envases con 28 y 56 comprimidos recubiertos de liberación prolongada.

Fecha de última revisión: febrero de 2023.

6112