


110 mm


DERCOLINA®


COLINA SALICILATO 8,720 g.
BENZALCONIO CLORURO 0,010 g.

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MÉDICO -

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **DERCOLINA** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada 100 g de **DERCOLINA** jalea (sabor Menta) contiene: Colina Salicilato 8,720 g; Benzalconio Cloruro 0,010 g; Excipientes: hidroxipropilcelulosa; glicerina; fosfato monopotásico anhidro; fosfato disódico anhidro; esencia de menta; anetol; sucralosa; alcohol; agua purificada.

¿Qué es DERCOLINA y para qué se usa?

DERCOLINA es un medicamento con acción anti-inflamatoria y analgésica tópica.

Se utiliza como tratamiento local de ulceraciones, heridas, e irritaciones de la mucosa bucal (labios, paladar, encías, lengua).

Antes de usar DERCOLINA

No use DERCOLINA si

- Presenta hipersensibilidad (alergia) a salicilato o a otros componentes del producto.
- Es un niño menor de tres años.

Tenga especial cuidado con DERCOLINA

- Tenga especial precaución en evitar el contacto del producto con los ojos ya que uno de sus componentes puede afectar la córnea.
- Debe tener en cuenta que este medicamento contiene alcohol como uno de sus componentes.
- Si no observa mejoría luego de varios días de tratamiento deberá consultar a su médico quien deberá reevaluar su tratamiento.

Toma simultánea de otros medicamentos

Uno de los componentes de este medicamento, el cloruro de benzalconio, cuando es aplicado tópicamente es incompatible con surfactantes aniónicos, sales de plata, sulfato y óxido de zinc, peróxido de hidrógeno y sales de aluminio.

¿Cómo usar DERCOLINA?

Aplique la jalea de **DERCOLINA** con un dedo limpio, efectuando un suave masaje sobre la lesión a tratar. La aplicación debe repetirse 3 o 4 veces por día.



Cortar el extremo
de la cánula y aplicar

Embarazo y lactancia

Se puede utilizar durante el embarazo y la lactancia.




8407

1

150 mm

110 mm



Uso en niños

No usar en niños menores de 3 años

A tener en cuenta mientras toma DERCOLINA

Efectos indeseables (adversos)

- Reacciones de hipersensibilidad (alergia) al salicilato.
- Irritación debido a la presencia de alcohol.

¿Cómo conservar DERCOLINA?

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
-

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Presentación

Envases con pomo de 20 g.

Si Ud. toma dosis mayores de DERCOLINA de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosisificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas".

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar

la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234".

Fecha de última revisión: mayo de 2019.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N° 33.185

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

E-8062-01 / D8407 / Act. 08/2025

CASASCO



8407

2

150 mm