200 mm

8738

AMINET®

CINACALCET (como clorhidrato) 30 mg
CINACALCET (como clorhidrato) 60 mg

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MÉDICO -

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **AMINET** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas
Comprimidos recubiertos x 30 mg
Cada comprimido recubierto contiene:
Cinacalcet 30 mg (como Cinacalcet clorhidrato 33,06 mg). Excipientes: celulosa microcristalina; povidona K 30; almidón pregelatinizado; crospovidona; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; hidroxipropilmetilcelulosa E-15; talco; dióxido de titanio; polietilenglicol 6000.

Comprimidos recubiertos x 60 mg
Cada comprimido recubierto contiene:
Cinacalcet 60 mg (como Cinacalcet clorhidrato 66,12 mg). Excipientes: celulosa microcristalina; povidona K 30; almidón pregelatinizado; crospovidona; dióxido de silicio coloidal; estearato de magnesio; hidroxipropilmetilcelulosa E-15; talco; dióxido de titanio; polietilenglicol 6000.

¿Qué es AMINET y para qué se usa?
AMINET es una medicación que baja los niveles de la hormona paratiroidea (PTH), calcio, y fósforo en el cuerpo.
AMINET se usa para tratar el hiperparatiroidismo (función hiperactiva de las glándulas paratiroides) en las personas que reciben diálisis de larga duración por una enfermedad del riñón.
AMINET también se usa para bajar niveles de calcio en personas con cáncer de las glándulas paratiroides.
AMINET puede también usarse para fines no mencionados en esta guía del medicamento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre AMINET?
Usted no debe tomar este medicamento si es alérgico a cinacalcet.
Llame a su médico de inmediato si usted tiene un efecto secundario grave durante la toma de **AMINET** como entumecimiento sensación de hormigueo alrededor de su boca, ritmo cardíaco rápido o lento, tensión o contracción muscular, reflejos hiperactivos, convulsiones, sensación de que le falta aire al respirar, hinchazón, ganancia de peso rápida, o sentir que se puede desmayar.

¿Qué debería conversar con el médico antes de tomar AMINET?
Para asegurarse que usted puede tomar **AMINET** de forma segura, dígale a su médico si usted tiene cualquiera de estas otras condiciones:
- presión arterial alta;
- enfermedad del corazón, fallo cardíaco, trastorno del ritmo cardíaco;
- historial de convulsiones;
- bajos niveles de calcio en su sangre (hipocalcemia); o
- enfermedad del hígado.

E-8393-01 / D8738 / Act.: 02/2026

CASASCO

8738

150 mm

200 mm

8738

¿Toma otras medicaciones con AMINET?
Dígale a su médico acerca de todos los medicamentos que usted usa. Incluya los productos que se obtienen con o sin receta, vitaminas, y productos herbarios. No empiece un nuevo medicamento sin primero decirle a su médico. Mantenga una lista de todas sus medicinas y muéstreselas al médico que lo atiende.

Embarazo y Lactancia
Dígale a su médico si usted está embarazada o planea quedar embarazada mientras está usando este medicamento. No se conoce si **AMINET** causará daño al bebé nonato.
No se sabe si **AMINET** pasa a la leche materna o si le puede hacer daño al bebé que está amamantando. Usted no debe amamantar mientras está tomando **AMINET**.

Uso en niños
No le dé este medicamento a un niño sin el consejo de un médico.

¿Cómo debo tomar AMINET?
Tómelo exactamente cómo lo haya recetado su médico. No lo tome en cantidades mayores o menores, o por más tiempo de lo recomendado. Siga las instrucciones en la etiqueta de su prescripción.
Tal vez su médico en ocasiones cambie su dosis para asegurarse de que está obteniendo los mejores resultados.
AMINET funciona mejor si se toma con comida o poco después de una comida.
No triture o rompa la tableta de **AMINET**. Trague la pastilla entera.
Para asegurar de que sus niveles de calcio y fósforo no bajen demasiado, habrá que examinar su sangre 1 semana después de empezar **AMINET** o cuando se cambie su dosis. Tal vez también necesite examinar su sangre con regularidad durante su tratamiento. No falte a ninguna de las visitas al médico.

¿Qué sucede si me salteo una dosis?
Tome la dosis pasada tan pronto se acuerde. Sáltese la dosis pasada si ya casi es hora para la siguiente dosis. No tome más medicina para alcanzar la dosis pasada.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de AMINET?
Busque atención médica de emergencia si tiene alguno de estos **síntomas de una reacción alérgica:** ronchas, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua, o garganta.
Llame a su médico de inmediato si usted tiene algún efecto secundario grave como:
- entumecimiento o sensación de hormigueo alrededor de su boca, paso cardíaco rápido o lento, tensión o contracción muscular, reflejos hiperactivos;
- convulsiones;
- sensación de que le falta aire al respirar, aun cuando la actividad es leve;
- hinchazón, ganancia de peso rápida; o
- sentir que se puede desmayar.

Efectos secundarios de menor gravedad pueden incluir:
- náusea, vómito, diarrea;
- pérdida del apetito;
- dolor muscular, dolor de pecho leve;
- mareo; o
- debilidad.

¿Qué otras drogas afectan la toma del AMINET?
Varias drogas pueden tener interacciones con **AMINET**. La lista que se presenta abajo no incluye todas las drogas. Dígale a su médico si usted está usando:
- cloroquina;
- conivaptan;
- diclofenac;
- imatinib;
- isoniazida (para tratar la tuberculosis);
- medicamentos para el agrandamiento de la próstata como tamsulosina o tolterodina;
- antibióticos como claritromicina o eritromicina;
- antidepresivos como amitriptilina, desipramina, duloxetina, fluoxetina, nefazodona, nortriptilina, paroxetina, sertralina, y otras;
- medicamentos antifúngicos como itraconazole o ketoconazole;
- medicinas para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH; ADHD por sus siglas en inglés), como atomoxetina, dextroamfetamina o metilfenidato;
- medicinas contra el cáncer como doxorubicina, lomustina, tamoxifeno;
- medicinas para la tos (narcótico con o sin receta);
- medicinas para el corazón o la presión arterial como carvedilol, diltiazem, felodipina, flecainida, labetalol, metoprolol, nifedipina, procainamida, propafenona, propranolol, verapamil y otras;
- medicinas para el VIH o SIDA como atazanavir, delavirdina, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir, o ritonavir;
- medicinas para el tratamiento de problemas psiquiátricos, como cloropromazina haloperidol, prometazina, o tioridazina; o
- medicamento para el dolor como codeína, hidrocodona, o tramadol.

¿Cómo debo conservar AMINET?
- Conservar desde 15°C hasta 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación: envases con 30 comprimidos recubiertos.

Si ud se aplica dosis mayores de AMINET de las que debiera
En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital A. Posadas: (011) 4 654-6648 / 4 658-7777, 0800-333-0160.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4 962-6666 / 2247, 0800-444-8694.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas".
"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos o llamar a ANMAT responde
0800-333-1234"

Esta especialidad medicinal está libre de gluten. Sin T.A.C.C.

Fecha de última revisión: Mayo de 2015.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Certificado N° 57.699.
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

8738

150 mm