

VOGAX® 10

VONOPRAZAN 10 MG



Comprimidos recubiertos

VOGAX® 20

VONOPRAZAN 20 MG

INFORMACION PARA EL PACIENTE

CONSULTE A SU MEDICO



Comprimidos recubiertos

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **VOGAX** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas

VOGAX 10

Cada comprimido recubierto contiene: Vonoprazan (equivalente a 13,36 mg de Vonoprazan fumarato) 10,000 mg. Excipientes: hidroxipropilcelulosa, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, ácido ascórbico, estearato de magnesio, manitol, hidroxipropilmetilcelulosa E15, propilenglicol, polietilenglicol 6000, dióxido de titanio, talco, povidona K-30, óxido hierro rojo (CI 77491).

VOGAX 20

Cada comprimido recubierto contiene: Vonoprazan (equivalente a 26,72 mg de Vonoprazan fumarato) 20,000 mg. Excipientes: hidroxipropilcelulosa, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, ácido ascórbico, estearato de magnesio, manitol, hidroxipropilmetilcelulosa E15, propilenglicol, polietilenglicol 6000, dióxido de titanio, talco, povidona K-30, óxido hierro rojo (CI 77491).

¿Qué es VOGAX y para qué se usa?

VOGAX es un medicamento de venta con receta llamado bloqueador de ácido competitivo con potasio.

VOGAX reduce la cantidad de ácido en el estómago.

VOGAX se utiliza en adultos:

- durante 8 semanas para curar el daño relacionado con el ácido en el revestimiento del esófago (llamado esofagitis erosiva) y para aliviar la acidez estomacal relacionada con la esofagitis erosiva.
- hasta 6 meses para mantener la curación de la esofagitis erosiva y para aliviar la acidez estomacal relacionada con la esofagitis erosiva.
- durante 4 semanas para aliviar la acidez estomacal relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico.
- durante 14 días con los antibióticos amoxicilina y claritromicina para tratar una infección causada por la bacteria llamada *Helicobacter pylori* (H. pylori).
- durante 14 días con el antibiótico amoxicilina para tratar una infección causada por la bacteria llamada H. pylori.

No se sabe si **VOGAX** es seguro y eficaz en niños.

Antes de usar VOGAX

No use VOGAX si

- Es alérgico al vonoprazan o a cualquiera de los ingredientes de **VOGAX**. Las manifestaciones alérgicas pueden incluir dificultad para respirar, sarpullido, picazón e hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta.
- Si está tomando algún producto que contiene rilpivirina que se usa para tratar el VIH-1 (virus de inmunodeficiencia humana).

Tenga especial cuidado con VOGAX

VOGAX podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

- Un tipo de problema renal (nefritis tubulointersticial aguda). Algunas personas que toman **VOGAX** pueden desarrollar un problema renal llamado nefritis tubulointersticial aguda. Llame a su médico de inmediato si tiene una disminución en la cantidad de orina o si tiene sangre en la orina.
- Diarrea causada por una infección (*Clostridioides difficile*) en los intestinos. Llame a su médico de inmediato si tiene heces líquidas, dolor de estómago o fiebre que no desaparece.
- Fracturas óseas (cadera, muñeca o columna vertebral). Las fracturas óseas en la cadera, la muñeca o la columna vertebral pueden ocurrir en personas que toman múltiples dosis diarias de otro tipo de medicamento que reduce el ácido en el estómago, conocido como inhibidores de la bomba de protones (medicamentos IBP), durante un período prolongado (un año o más). Informe a su médico si tiene una fractura ósea, especialmente en la cadera, la muñeca o la columna vertebral.
- Reacciones cutáneas severas. **VOGAX** puede causar reacciones cutáneas raras pero severas que pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Estas reacciones cutáneas severas pueden requerir tratamiento en un hospital y pueden poner en riesgo la vida:
 - Erupción cutánea, que puede presentar ampollas, descamación o sangrado en cualquier parte de la piel (incluidos los labios, los ojos, la boca, la nariz, los genitales, las manos o los pies).
 - También puede tener fiebre, escalofríos, dolores corporales, dificultad para respirar o ganglios linfáticos agrandados.

Si tiene alguno de estos síntomas, deje de tomar **VOGAX** y llame a su médico de inmediato. Estos síntomas pueden ser el primer signo de una reacción cutánea severa.

- Niveles bajos de vitamina B-12. **VOGAX** reduce la cantidad de ácido en el estómago. El ácido del estómago es necesario para absorber la vitamina B12 de forma adecuada. Informe a su médico si presenta síntomas de niveles bajos de vitamina B12, incluidos ritmo cardíaco irregular, dificultad para respirar, mareos, hormigueo o entumecimiento en los brazos y las piernas, debilidad muscular, piel pálida, sensación de cansancio o cambios de humor. Hable con su médico sobre el riesgo de tener niveles bajos de vitamina B12 si ha estado tomando **VOGAX** durante mucho tiempo.
- Las personas que toman **VOGAX** pueden tener niveles bajos de magnesio en el cuerpo. Informe a su médico de inmediato si tiene síntomas de niveles bajos de magnesio, como convulsiones, mareos, ritmo cardíaco irregular, nerviosismo, dolores o debilidad muscular o espasmos en las manos, los pies o la voz.
- Crecimientos en el estómago (pólipos de la glándula fúndica). Un cierto tipo de crecimiento en el estómago llamado pólipos en las glándulas fúndicas puede ocurrir en personas que toman **VOGAX** durante un tiempo prolongado (más de un año). Hable con su médico sobre el riesgo de pólipos en las glándulas fúndicas si ha estado tomando **VOGAX** durante un tiempo prolongado.

Toma simultánea de otros medicamentos

Consulte a su médico si está tomando:

- Midazolam (droga ansiolítica y sedativa)
- Claritromicina (antibiótico)
- Rifampicina (antibiótico)

- Efavirenz (droga para el tratamiento del HIV)

¿Cómo usar VOGAX?

- Tome **VOGAX** exactamente como se lo indique su médico.
- No cambie su dosis ni deje de tomar **VOGAX** sin hablar primero con su médico.
- Trague los comprimidos de **VOGAX** enteros. No mastique ni triture el comprimido.

Dosis recomendadas:

- Para el tratamiento de la esofagitis erosiva:
 - Curación de la esofagitis erosiva: **VOGAX** 20 mg una vez al día durante 8 semanas.
 - Mantenimiento de la esofagitis erosiva curada: **VOGAX** 10 mg una vez al día durante hasta 6 meses.
- Para el alivio de la acidez estomacal relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo: **VOGAX** 10 mg una vez al día durante 4 semanas.
- Para el tratamiento de la infección por H. pylori:
 - Triple terapia: la dosis oral recomendada en adultos es **VOGAX** 20 mg más amoxicilina 1000 mg más claritromicina 500 mg, cada una administrada dos veces por día (cada 12 horas a la mañana y por la noche) durante 14 días.
 - Doble terapia: la dosis oral recomendada en adultos es **VOGAX** 20 mg administrado dos veces por día (por la mañana y por la noche) más amoxicilina 1000 mg tres veces por día (por la mañana, al mediodía y por la noche) durante 14 días.

Consulte a su médico por las dosis recomendadas en caso de presentar insuficiencia renal o hepática.

Embarazo

No existen estudios adecuados sobre **VOGAX** en mujeres embarazadas.

Lactancia

Se recomienda no amamantar durante el tratamiento con **VOGAX**.

Uso en niños

No existen estudios adecuados sobre **VOGAX** en niños.

Uso en ancianos

Es similar al uso en adultos

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos y uso de maquinaria

El uso de este medicamento no altera la capacidad de conducción de vehículos ni la utilización de maquinarias.

Toma conjunta de VOGAX con alimentos y bebidas

- Puede tomar **VOGAX** con o sin alimentos.

Uso apropiado del medicamento

Si se olvidó de tomar VOGAX

- Para el tratamiento de la esofagitis erosiva o el alivio de la acidez estomacal relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico:
 - Si olvida una dosis de **VOGAX**, tómela lo antes posible dentro de las 12 horas posteriores a la dosis olvidada. Si han pasado más de 12 horas, omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora programada regularmente.
- Para el tratamiento de la infección por H. pylori:

- Si olvida una dosis de **VOGAX**, tómela lo antes posible dentro de las 4 horas posteriores a la dosis olvidada. Si han pasado más de 4 horas, omita la dosis olvidada y tome la siguiente dosis a la hora programada regularmente. Continúe con su programa de dosificación habitual hasta que finalice el tratamiento.

A tener en cuenta mientras toma VOGAX

Efectos indeseables (adversos)

Los efectos secundarios más comunes de **VOGAX** para el tratamiento de la esofagitis erosiva y/o el alivio de la acidez estomacal relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico incluyen:

- inflamación del estómago.
- diarrea.
- distensión estomacal.
- hinchazón de estómago.
- indigestión.
- estreñimiento.
- presión arterial alta.
- dolor de estómago.
- náuseas.
- infección del tracto urinario.

Los efectos secundarios más comunes de **VOGAX** cuando se usa con antibióticos para el tratamiento de la infección por *H. pylori* incluyen:

- diarrea.
- cambios temporales en el sentido del gusto.
- candidiasis vaginal.
- dolor de estómago.
- dolor de cabeza.
- presión arterial alta.
- síntomas similares a los de un resfriado.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de **VOGAX**

Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

¿Cómo conservar VOGAX?

- Conservar en su envase original en lugar seco, desde 15°C hasta 25°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: Junio de 2025.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Si Ud. toma dosis mayores de VOGAX de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas”.**
**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.
Certificado N° 60.430
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

