

MONTRATE® PLUS



FEXOFENADINA CLORHIDRATO 120 mg;
MONTELUKAST 10 mg
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
CONSULTE A SU MÉDICO

Comprimidos recubiertos

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **MONTRATE PLUS** y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene:

Fexofenadina Clorhidrato 120,000 mg; Montelukast (como montelukast sódico) 10,000 mg. Excipientes: celulosa microcristalina; lactosa; hidroxipropilcelulosa; croscarmelosa sódica; crospovidona; estearato de magnesio; talco; hidroxipropilmetilcelulosa E15; polietilenglicol 6000; dióxido de titanio; povidona K30; óxido de hierro amarillo.

¿Qué es MONTRATE PLUS y para qué se usa?

MONTRATE PLUS es un medicamento que contiene montelukast y fexofenadina. El montelukast bloquea unas sustancias llamadas leucotrienos, un tipo de mediadores inflamatorios que aumentan durante los episodios de alergia en la vía respiratoria. La fexofenadina es un antagonista de los receptores H1 de la histamina, sustancia que se libera durante la reacción alérgica.

Su médico le ha recetado MONTRATE PLUS para el tratamiento de su rinitis alérgica. MONTRATE PLUS está indicado solo para pacientes adultos.

¿Qué es la rinitis alérgica?

La rinitis alérgica es una enfermedad alérgica de las vías respiratorias altas producida por sustancias que causan alergia (alérgenos) y produce los siguientes síntomas diurnos y nocturnos: Nariz congestionada, con secreción y picazón, estornudos y lagrimeo con ojos hinchados, enrojecidos y con picazón.

Existen 2 tipos de rinitis alérgica: 1- La rinitis alérgica estacional (también conocida como fiebre del heno) se desencadena por pólenes de algunos árboles, pasto o malezas presentes en el aire; y 2- La rinitis alérgica perenne, que puede ocurrir todo el año y es desencadenada por alérgenos como ácaros del polvo de la casa, caspa de animales y/o esporas de moho.

¿Qué cuidados especiales debe tener antes de usar MONTRATE PLUS?

No tome MONTRATE PLUS si:

- Es alérgico al montelukast, a la fexofenadina o a cualquiera de los excipientes de este medicamento.

Consulte a su médico si:

- Aparecieran síntomas neuropsiquiátricos (como agitación, agresividad u hostilidad, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, alucinaciones, insomnio, irritabilidad, inquietud, sonambulismo, temblores e ideación y comportamiento suicida) mientras toma MONTRATE PLUS, consulte inmediatamente a su médico.
- Aparece en sangre un tipo de glóbulos blancos llamados eosinófilos (eosinofilia sistémica) ya que en ocasiones puede presentarse con las características clínicas de una vasculitis (llamado síndrome de Churg-Strauss) caracterizado por la aparición de lesiones en la piel, síntomas pulmonares, complicaciones cardíacas y/o neuropatía.

- Tiene sensibilidad comprobada a la aspirina, debe evitar tomarla, así como otros agentes antiinflamatorios no esteroideos mientras tome MONTRATE PLUS.
- Estaba utilizando corticoesteroides inhalables para su rinitis, no los sustituya de manera abrupta por MONTRATE PLUS. Debe reducirlos gradualmente pero solo bajo supervisión de su médico.
- MONTRATE PLUS no está indicado para la reversión de broncoespasmos en crisis asmáticas agudas, incluido el estado asmático. Usted deberá emplear el medicamento de rescate que usa habitualmente.
- Tiene problemas con el funcionamiento del hígado o los riñones.

¿Qué se debe tener en cuenta si toma otros medicamentos y le indican MONTRATE PLUS?

Algunos medicamentos pueden afectar al funcionamiento de MONTRATE PLUS o este puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos que esté utilizando.

Relacionados con el Montelukast:

Antes de tomar MONTRATE PLUS, informe a su médico si está tomando los siguientes medicamentos:

- fenobarbital (usado para el tratamiento de la epilepsia).
- fenitoína (usado para el tratamiento de la epilepsia).
- rifampicina (usado para el tratamiento de la tuberculosis y algunas otras infecciones).
- gemfibrozilo (usado para el tratamiento de niveles elevados de lípidos en plasma).
- eritromicina.
- ketoconazol.

Relacionados con la Fexofenadina:

- Si usted toma medicamentos digestivos que contienen aluminio y magnesio, se recomienda dejar un intervalo de 2 horas entre el momento de tomarlos e ingerir MONTRATE PLUS.

¿Cómo usar MONTRATE PLUS?

Debe tomar un comprimido una vez al día.

¿Se puede utilizar MONTRATE PLUS durante el embarazo y lactancia?

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Su médico determinará si puede utilizar **MONTRATE PLUS** durante el embarazo únicamente si el posible beneficio supera el posible riesgo para el bebé en gestación.

MONTRATE PLUS no debe utilizarse en mujeres que amamenten a no ser que su médico determine que el posible beneficio supera el posible riesgo para el bebé.

¿Los niños pueden recibir MONTRATE PLUS?

Este producto no está indicado para el uso en niños.

¿Cómo se debe utilizar MONTRATE PLUS en ancianos?

Los adultos mayores pueden ser más sensibles a la fexofenadina que las personas más jóvenes. Si usted tiene 65 años o más, consulte a su médico antes de tomar MONTRATE PLUS.

¿Cómo afecta MONTRATE PLUS a la capacidad de conducción de vehículos?

No es probable que MONTRATE PLUS altere su capacidad de conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, asegúrese de que esta medicación no le dé somnolencia.

¿Se puede tomar MONTRATE PLUS en forma conjunta con alimentos y bebidas?

No tome MONTRATE PLUS con jugos de fruta (pomelo, naranja, manzana) ya que estos disminuyen la absorción digestiva de la fexofenadina y por lo tanto el efecto terapéutico.

Uso apropiado del medicamento MONTRATE PLUS

¿Qué debe hacer si se olvidó de tomar MONTRATE PLUS?

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Tome la dosis siguiente en el momento que le corresponde.

A tener en cuenta mientras toma MONTRATE PLUS:

¿Cuáles son los Efectos indeseables (adversos) de MONTRATE PLUS?

Relacionados a Montelukast:

Los efectos indeseables más comunes incluyen:

- dolor de estómago
- molestia de estómago o intestinal
- acidez
- cansancio
- fiebre
- nariz congestionada
- tos
- síntomas gripales
- infección respiratoria superior
- mareos
- cefalea
- rash

Los efectos colaterales menos comunes incluyen:

- Tendencia incrementada al sangrado
- Reacciones alérgicas [incluyen hinchazón de la cara, los labios, la lengua, y/o la garganta (que puede causar trastornos para tragar o respirar), ronchas y rascado]
- Mareos, pinchazos, entumecimiento, convulsiones.
- Palpitaciones
- Sangrado nasal
- Diarrea, indigestión, inflamación del páncreas, náuseas, vómitos
- Hepatitis
- Magulladuras
- Dolor articular, dolores y calambres musculares
- Hinchazón

Relacionados a Fexofenadina

Los efectos indeseables más comunes son los siguientes:

- Dolor de cabeza
- Somnolencia
- Náuseas
- Mareo

Los efectos colaterales menos comunes incluyen:

- Cansancio
- Somnolencia

Los de frecuencia no conocida son los siguientes:

- Dificultad para dormir (insomnio)
- Trastornos del sueño – Pesadillas
- Nerviosismo
- Latidos del corazón rápidos o irregulares
- Diarrea
- Urticaria y picazón
- Erupción

Reacciones alérgicas graves que pueden causar hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, sofocos, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Consulte inmediatamente a su médico

¿Cómo conservar MONTRATE PLUS?

- Conservar en su envase original a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 10 y 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: Mayo de 2022.

Si Ud. toma dosis mayores de MONTRATE PLUS de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas”.

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

Certificado N° 59.524

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

