

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **HIPOLIPOL** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada comprimido recubierto x 40 mg contiene: Rosuvastatina (Como Rosuvastatina Cálcica) 40,00 mg; Excipientes: celulosa microcristalina; lactosa; croscarmelosa sódica; povidona K-30; crospovidona; talco; estearato de magnesio; hidroxipropilmetilcelulosa E15; polietilenglicol 6000; bióxido de titanio.

¿Qué es HIPOLIPOL y para qué se usa?

HIPOLIPOL es un medicamento que pertenece a un grupo de medicamentos que reducen el colesterol llamados estatinas. Junto con la dieta, HIPOLIPOL reduce el colesterol “malo” (C-LDL) y aumenta el colesterol “bueno” (C-HDL). Si los niveles de colesterol malo no son tratados, se pueden crear depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos (placa). Esta acumulación de placa en el tiempo, puede conducir al estrechamiento de estos vasos. Esta es una de las causas más frecuentes de enfermedad cardíaca. Con la reducción del colesterol malo en su sangre, HIPOLIPOL puede demorar la formación de placa en las paredes de los vasos sanguíneos, con reducción del riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en adultos mayores sin enfermedad cardíaca conocida.

¿Qué es el colesterol?

El colesterol es una sustancia grasa, un tipo de lípido, que se encuentra normalmente en el torrente sanguíneo. Su cuerpo necesita cierta cantidad de colesterol para funcionar de manera correcta. Pero el colesterol elevado puede conducir a experimentar problemas de salud. El C-LDL es conocido como colesterol malo porque si usted tiene mucho en su torrente sanguíneo, puede convertirse en un peligro para su salud y puede conducir a enfermedades potencialmente serias. El C-HDL es conocido como el colesterol bueno debido a que ayuda a remover el exceso de colesterol.

Los factores de salud frecuentes como diabetes, presión arterial alta, tabaquismo, obesidad, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca temprana, y edad pueden hacer que controlar su colesterol sea incluso más importante.

¿Qué es la aterosclerosis?

La aterosclerosis es una formación progresiva de placa en las arterias, a lo largo del tiempo. Una causa importante es los niveles altos de C-LDL. Otros factores de salud, como antecedentes familiares, diabetes, presión arterial alta, si usted fuma o tiene sobrepeso, pueden también jugar un rol en la formación de placa en las arterias. A menudo esta placa comienza a acumularse en las arterias en la edad adulta temprana y empeora con el tiempo.

¿Cómo funciona HIPOLIPOL?

La mayor parte del colesterol en su sangre es fabricado en el hígado. HIPOLIPOL funciona reduciendo el colesterol de dos maneras: bloquea una enzima en el hígado para fabricar menos colesterol y aumenta la captación y descomposición por el hígado del colesterol que existe en la sangre.

Antes de usar HIPOLIPOL

No use HIPOLIPOL si

- Tiene antecedentes de dolor muscular o debilidad
- Está embarazada o piensa que puede estar embarazada, o está planeando quedar embarazada
- Está amamantando
- Toma más de dos vasos de alcohol diarios
- Tiene problemas de hígado
- Tiene problemas de riñón
- Tiene problemas de tiroides
- Es asiático o de ascendencia asiática
- Ha tenido una reacción alérgica a HIPOLIPOL o es alérgico a cualquiera de sus componentes.

Tenga especial cuidado con HIPOLIPOL

Toma simultánea de otros medicamentos

Informe al médico sobre todos los medicamentos que usted está tomando o planea tomar, incluyendo los medicamentos de prescripción y de venta libre, vitaminas, y suplementos herbarios. Algunos medicamentos pueden interactuar con HIPOLIPOL, causando efectos colaterales. Es especialmente importante informar a su médico si usted está tomando o planea tomar medicamentos para:

- Su sistema inmunológico
- Colesterol/triglicéridos
- Anticoagulantes
- HIV/SIDA
- Evitar el embarazo

Es importante que ud conozca y pueda describir todos los medicamentos que usted toma. Es siempre una buena idea controlar que usted tenga la prescripción correcta antes de abandonar la farmacia y antes de tomar cualquier medicamento. Lleve un listado de los medicamentos con usted para mostrarle al médico.

Si usted necesita ir al hospital o hacerse una cirugía, informe a los médicos sobre todos los medicamentos que usted está tomando.

¿Cómo usar HIPOLIPOL?

Tome HIPOLIPOL exactamente como le fuera indicado por su médico. No cambie su dosis ni suspenda HIPOLIPOL sin conversar con su médico, incluso si usted se siente bien.

Su médico puede hacerle análisis de sangre para controlar sus niveles de colesterol antes y durante su tratamiento con HIPOLIPOL. Su dosis de HIPOLIPOL puede ser modificada en base a los resultados de esos análisis.

HIPOLIPOL puede tomarse en cualquier momento del día, con o sin comida.

Trague los comprimidos enteros.

El médico puede comenzar con una dieta para reducir el colesterol antes de indicarle HIPOLIPOL. Continúe con esta dieta cuando usted tome HIPOLIPOL.

Espere por lo menos dos horas después de tomar HIPOLIPOL para tomar un antiácido que contenga una combinación de aluminio e hidróxido de magnesio.

Uso en niños

La seguridad y efectividad de HIPOLIPOL no ha sido establecida en pacientes pediátricos menores a 10 años.

Uso en ancianos

HIPOLIPOL puede emplearse en pacientes geriátricos.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

HIPOLIPOL no actúa sobre la capacidad en la conducción de vehículos.

Toma conjunta de HIPOLIPOL con alimentos y bebidas

No se han descrito interacciones con alimentos y bebidas.

Uso apropiado del medicamento HIPOLIPOL

Se olvidó de tomar HIPOLIPOL

Si usted pierde una dosis de HIPOLIPOL, tómela tan pronto como lo recuerde.

Sin embargo, **no tome dos dosis de HIPOLIPOL con un intervalo menor a 12 horas.**

A tener en cuenta mientras toma HIPOLIPOL

Efectos indeseables (adversos)

HIPOLIPOL puede ocasionar efectos colaterales en algunas personas.

Los efectos colaterales serios pueden incluir

Problemas musculares

Llame a su médico de inmediato si usted experimenta dolor muscular no explicado, sensibilidad o debilidad especialmente con fiebre. Esto puede ser un signo temprano de un raro problema muscular que puede conducir a problemas renales serios. El riesgo de problemas musculares es mayor en personas que tengan 65 años edad o mayores, o quienes ya tienen problemas de tiroides o de riñón. La posibilidad de problemas musculares puede verse incrementada si usted está tomando algunos otros medicamentos con HIPOLIPOL.

Si usted tiene problemas musculares que no se van incluso después de que el médico le haya advertido que deje de tomar HIPOLIPOL, notifique a su médico.

Este puede realizarle análisis adicionales para diagnosticar la causa de sus problemas musculares.

Problemas hepáticos

El médico debe realizar análisis de sangre para controlar su hígado antes de comenzar a tomar HIPOLIPOL y si usted tuviera síntomas de problemas hepáticos mientras está tomando HIPOLIPOL. Llame a su médico de inmediato si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas de problemas hepáticos:

- Sentirse extremadamente cansado o débil.
- Pérdida de apetito
- Dolor superior de panza.
- Orina oscura.
- Amarilleo de la piel o en lo blanco de sus ojos.

Los efectos colaterales más frecuentes pueden incluir:

Dolor de cabeza, molestias y dolores musculares, dolor abdominal, debilidad y náuseas.

Los siguientes efectos colaterales adicionales han sido reportados con HIPOLIPOL. Pérdida de memoria y confusión.

Esta no es una lista completa de efectos colaterales de HIPOLIPOL. Converse con su médico por una lista completa o si usted ha experimentado efectos colaterales que le molestan o que no desaparecen.

¿Cómo conservar HIPOLIPOL?

- Conservar en su envase original en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15°C y 30°C.

- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 28 y 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: Septiembre de 2018

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Si ud toma dosis mayores de HIPOLIPOL de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT**

**<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 54.640

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**