

PSEUDOEFEDRINA CLORHIDRATO 120,00 mg
FEXOFENADINA CLORHIDRATO 60,00 mg
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
CONSULTE A SU MÉDICO

Comprimidos recubiertos
de liberación modificada

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **ALERCAS D** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada comprimido recubierto de liberación modificada contiene:

Pseudoefedrina clorhidrato 120,000 mg; Fexofenadina clorhidrato 60,000 mg. Excipientes: fosfato bicálcico; Kollidon SR; hidroxipropilmetilcelulosa K100; hidroxipropilmetilcelulosa K4; hidroxipropilmetilcelulosa E-15; amarillo de quinolina laca aluminica; amarillo ocazo laca aluminica; almidón de maíz; lactosa; povidona K-30; croscarmelosa sódica; hidroxipropilcelulosa; crospovidona; estearato de magnesio; talco; polietilenglicol 6000.

¿Qué es ALERCAS D y para qué se usa?

ALERCAS D es un medicamento que combina la fexofenadina con pseudoefedrina. La fexofenadina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihistamínicos. Su función es bloquear los efectos de la histamina, una sustancia que en el cuerpo causa los síntomas de las alergias. La pseudoefedrina pertenece a una clase de medicamentos llamados descongestivos cuya función es abrir o destapar las vías nasales. Se usa en adultos y niños mayores de 12 años, para aliviar los síntomas de la rinitis alérgica estacional (fiebre del heno), incluyendo la secreción nasal, estornudos, congestión (nariz tapada), enrojecimiento, lagrimeo y picazón de los ojos, o picazón de la nariz, garganta o del paladar.

Antes de usar ALERCAS D

No use ALERCAS D

- Si es alérgico a la fexofenadina, a la pseudoefedrina, o a cualquiera de los componentes de los comprimidos. Pídale a su farmacéutico una lista de dichos componentes.
- Si usted está tomando inhibidores de monoamino oxidasa (MAO), incluyendo isocarboxazida, fenelzina, selegilina, o tranilcipromina, o si ha dejado de tomarlos en los últimos 14 días.
- Si está embarazada o durante la lactancia.
- En niños menores de 12 años

Tenga especial cuidado con ALERCAS D.

- Si tiene o alguna vez ha tenido angina (dolor o presión en el pecho), diabetes, un ataque cardíaco, hipertiroidismo (glándula tiroides demasiado activa), hipertrofia prostática (agrandamiento de la próstata), o enfermedades al corazón o al riñón.
- Si usted tiene glaucoma, dificultad para orinar, hipertensión o enfermedades a las arterias coronarias (un trastorno que ocurre cuando los vasos sanguíneos del corazón se taponan por depósitos de grasa o colesterol).
- Si usted ha tenido síntomas como insomnio, mareos, debilidad, temblores de una parte de su cuerpo que usted no puede controlar, o ritmo cardíaco más rápido que lo normal, irregular o palpitaciones después de tomar medicamentos adrenérgicos como fenilefrina, o epinefrina.

Consulte a su médico ya que probablemente le dirá que usted no debe tomar la combinación de fexofenadina y pseudoefedrina

- Si estas tomando **ALERCAS D** pueden dar positivos los análisis de dopaje para deportistas

Toma simultánea de otros medicamentos

- Dígale a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción, vitaminas, suplementos nutricionales y productos fabricados a base de hierbas está tomando o planea tomar. Asegúrese de mencionar los siguientes: medicamentos para controlar el asma; pastillas para bajar de peso; digoxina; eritromicina; ketoconazol; medicamentos para la hipertensión como alfametildopa y reserpina y antihistamínicos, descongestionantes, o estimulantes de venta libre (sin prescripción). Su doctor podría necesitar cambiar la dosis de sus medicamentos o vigilarle cuidadosamente para evitar efectos secundarios.
- Si usted está tomando un antiácido que contiene aluminio o magnesio, tome el antiácido pocas horas antes o después de tomar la fexofenadina.

Embarazo y lactancia

- Dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.

¿Cómo usar ALERCAS D?

La combinación de fexofenadina y pseudoefedrina viene en forma de comprimidos de liberación prolongada para tomar por vía oral. En general se toma un comprimido dos veces por día con el estómago vacío, con agua. Tome este medicamento alrededor de las mismas horas todos los días. Use el medicamento exactamente como se lo indico su médico. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.

La combinación de fexofenadina y pseudoefedrina controla los síntomas de la rinitis alérgica estacional pero no cura este trastorno. Si usted deja pasar demasiado tiempo entre las dosis, sus síntomas pueden empeorar.

Uso en niños

Esta indicado en niños a partir de los 12 años de edad. No se ha establecida la seguridad y eficacia de **ALERCAS D** en niños menores a 12 años

Uso en ancianos

La dosis es la misma que para los adultos; no es necesario efectuar ajuste de dosis

Toma conjunta de ALERCAS D con alimentos y bebidas

Las bebidas que contienen cafeína (café, té sodas y bebidas energizantes) pueden agravar la agitación y el insomnio causados por la pseudoefedrina en personas sensibles, por lo que usted debería beber menos de este tipo de bebidas. Converse con su doctor acerca del consumo de estas bebidas mientras toma este medicamento.

La combinación de fexofenadina y pseudoefedrina funcionará mejor si no se toma con jugos de frutas como jugo de naranjas, pomelo o manzana.

Uso apropiado del medicamento ALERCAS D

No tome este medicamento por más de 5 días.

Tome los comprimidos enteros; no las parta, mastique ni muela.

Se olvidó de tomar ALERCAS D

Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sátese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

A tener en cuenta mientras toma ALERCAS D***Efectos indeseables (adversos)***

Este medicamento puede provocar efectos secundarios. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve grave o no desaparece:

- dolor de cabeza,
- náusea,
- dolor de estómago,
- acidez estomacal,
- sensación de sequedad en la boca,
- irritación de la garganta,
- dolor de espalda,
- palidez.

Algunos efectos secundarios podrían provocar graves consecuencias para la salud. Los siguientes síntomas son poco comunes, pero si experimenta alguno de ellos, llame a su doctor de inmediato:

- nerviosismo,
- mareos,
- dificultad para quedarse o permanecer dormido,
- debilidad,
- temor, ansiedad o tensión,
- alucinaciones (ver o escuchar cosas que no existen),
- temblor incontrolable de una parte de su cuerpo,
- crisis convulsivas,
- desmayos,
- visión borrosa,
- urticaria,
- sarpullido (erupciones en la piel),
- picazón,
- dificultad para respirar o tragar,
- inflamación (hinchazón) de la cara, garganta, lengua, labios, ojos, manos, pies, tobillos y pantorrillas,
- ronquera,
- ritmo cardíaco más rápido que lo normal o irregular, o palpitaciones,
- dificultad o dolor al orinar.

La combinación de fexofenadina y pseudoefedrina puede provocar otros efectos secundarios. Llame a su doctor si tiene cualquier problema inusual mientras toma este medicamento.

¿Cómo conservar ALERCAS D?

- Conservar en su envase original desde 15°C hasta 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con envases con 10 comprimidos recubiertos de liberación modificada.

Fecha de última revisión: Agosto de 2015

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Si ud toma dosis mayores de ALERCAS D de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

**“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT**

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234”

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 47.229

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**