

150 mm

SENTIDO DE FIBRA

250 mm

L869



ALERCAS® 60



FEXOFENADINA CLORHIDRATO

COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS

Venta Bajo Receta - Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
-CONSULTE A SU MÉDICO -

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar ALERCAS 60 y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene: Fexofenadina clorhidrato 60,00 mg; Excipientes: almidón de maíz; lactosa; povidona K-30; croscarmelosa sódica, estearato de magnesio; talco; hidroxipropilmetilcelulosa E-15; polietilenglicol 6000; propilenglicol; bióxido de titanio; sacarina sódica; óxido de hierro rojo.

¿Qué es ALERCAS y para qué se usa?

ALERCAS 60 contiene fexofenadina clorhidrato, fármaco que pertenece al grupo de los antihistamínicos, que son medicamentos antialérgicos. ALERCAS 60 se utiliza en adultos y adolescentes de 12 años de edad o mayores para el alivio de los síntomas asociados a la alergia propia de la rinitis alérgica estacional, que se manifiesta con estornudos, goteo nasal acuoso, y picazón en nariz, paladar, garganta y ojos, con aumento de secreción lagrimal y taponamiento de la nariz. También se utiliza para el tratamiento de la urticaria crónica en adultos y adolescentes mayores de 12 años de edad.

Antes de usar ALERCAS 60

No use ALERCAS 60 si

Si es alérgico a fexofenadina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

¿Cómo conservar ALERCAS 60?

- Conservar en lugar fresco y seco, entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Presentación

Envases con 10 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: marzo de 2018.

Si Ud. toma dosis mayores de ALERCAS 60 de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694. Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160. Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas”.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Certificado N° 48.720
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - CABA - Argentina.

E-5651-01 / D5987/ Act. 06/2023



4

1

SENTIDO DE FIBRA

250 mm

150 mm

Tenga especial cuidado con ALERCAS 60

Si tiene problemas con el funcionamiento del hígado o los riñones

Toma simultánea de otros medicamentos

Comunique a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. Los productos digestivos que contengan aluminio y magnesio pueden disminuir la cantidad de ALERCAS 60 que se absorbe, por lo que se recomienda dejar un intervalo de 2 horas entre la toma de ambos productos.

¿Cómo usar ALERCAS 60?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

En adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores

Con rinitis alérgica estacional: 60 mg 2 veces por día ó 120 mg una vez al día. En pacientes con disminución de la función renal se recomienda una dosis inicial de 60 mg/día. Con urticaria idiopática crónica: 180 mg una vez por día. En pacientes con disminución de la función renal se recomienda una dosis inicial de 60 mg/día.

En niños y adolescentes

ALERCAS 60 no está recomendada en menores de 12 años de edad. En estos casos se recomienda el uso de ALERCAS Suspensión oral.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. No tome ALERCAS 60 si está embarazada a menos que sea absolutamente necesario. No se recomienda la toma de ALERCAS 60 durante el periodo de lactancia.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

No es probable que ALERCAS 60 comprimidos afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, antes de conducir u operar maquinarias, asegúrese de que estos comprimidos no le provocan somnolencia.

2



Toma conjunta de ALERCAS 60 con alimentos y bebidas

La toma de ALERCAS 60 con jugos de fruta (pomelo, naranja, manzana) disminuye la absorción del medicamento, y por lo tanto su efecto terapéutico.

Uso apropiado del medicamento ALERCAS 60

Si se olvidó de tomar ALERCAS 60
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
Tome la dosis siguiente en su momento como le haya recetado su médico.

A tener en cuenta mientras toma ALERCAS 60

Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos secundarios frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Dolor de cabeza
- Somnolencia
- Nauseas
- Mareo

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Cansancio

Otros efectos secundarios adicionales que pueden producirse son

- Dificultad para dormir (insomnio)
- Trastornos del sueño
- Pesadillas
- Nerviosismo
- Latidos del corazón rápidos o irregulares
- Diarrea
- Urticaria y picor
- Erupción

- Reacciones alérgicas graves que pueden causar hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, sofocos, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

3