SENTIDO DE FIBRA

250 mm

7433

ALERCAS® 120 y 180

FEXOFENADINA CLORHIDRATO

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Venta Bajo Receta - Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
-CONSULTE A SU MÉDICO -

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **ALERCAS** y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas
ALERCAS 120: cada comprimido recubierto contiene: Fexofenadina clorhidrato 120,0 mg; Excipientes: almidón de maíz; lactosa; povidona K-30; croscarmelosa sódica; estearato de magnesio; talco; hidroxipropilmetilcelulosa E-15; polietilenglicol 6000; propilenglicol; bióxido de titanio, sacarina sódica, óxido de hierro rojo.
ALERCAS 180: cada comprimido recubierto contiene: Fexofenadina clorhidrato 180,0 mg; Excipientes: almidón de maíz; lactosa; povidona K-30; croscarmelosa sódica; estearato de magnesio; talco; hidroxipropilmetilcelulosa E-15; polietilenglicol 6000; propilenglicol; bióxido de titanio, sacarina sódica, óxido de hierro rojo.

¿Qué es ALERCAS y para qué se usa?
ALERCAS 120 mg y **ALERCAS** 180 mg contienen fexofenadina clorhidrato, fármaco que pertenece al grupo de los antihistamínicos, que son medicamentos antialérgicos.
ALERCAS 120 mg se utiliza en adultos y adolescentes de 12 años de edad o mayores para el alivio de los síntomas asociados a la alergia propia de la rinitis alérgica estacional, que se manifiesta con estornudos, goteo nasal acuoso, y picazón en nariz, paladar, garganta y ojos, con aumento de secreción lagrimal y taponamiento de la nariz.
ALERCAS 180 mg se utiliza para el tratamiento de la urticaria crónica en adultos y adolescentes mayores de 12 años de edad.
Antes de usar ALERCAS
No use ALERCAS si
Si es alérgico a fexofenadina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

150 mm

Presentaciones:
Envases con 10 y 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: marzo de 2018.

Si Ud. toma dosis mayores de ALERCAS de las que debiera
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777/ 0800-333-0160.
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247/ 0800-444-8694.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas". "Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Certificado N° 48.720
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

E-7094-01 / D7433 / Act.: 07/2024

CASASCO

SENTIDO DE FIBRA

250 mm

150 mm

Tenga especial cuidado con ALERCAS
Si tiene problemas con el funcionamiento del hígado o los riñones.

Toma simultánea de otros medicamentos
Comunique a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.
Los productos digestivos que contengan aluminio y magnesio pueden disminuir la cantidad de **ALERCAS** que se absorbe, por lo que se recomienda dejar un intervalo de 2 horas entre la toma de ambos productos.

¿Cómo usar ALERCAS?
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

Adultos y adolescentes de 12 años y mayores
Rinitis alérgica: la dosis recomendada es un comprimido de **ALERCAS** 120 mg /día.
Urticaria crónica: la dosis recomendada es de un comprimido de **ALERCAS** 180 mg /día.
En caso de insuficiencia en la función de los riñones, se recomienda iniciar el tratamiento con 60 mg/ día (medio comprimido de 120 mg)

Uso en niños y adolescentes
ALERCAS 120/ 180 mg no está recomendada en menores de 12 años de edad. En estos casos se recomienda el empleo de **ALERCAS** Suspensión oral.

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.
No tome **ALERCAS** si está embarazada a menos que sea absolutamente necesario.
No se recomienda la toma de ALERCAS durante el periodo de lactancia.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos
No es probable que **ALERCAS** 120/ 180 comprimidos afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, antes de conducir u operar maquinarias, asegúrese de que estos comprimidos no le provocan somnolencia.

Toma conjunta de ALERCAS con alimentos y bebidas
La toma de **ALERCAS** 120/ 180 con jugos de fruta (pomelo, naranja, manzana) disminuye la absorción del medicamento, y por lo tanto su efecto terapéutico.

Uso apropiado del medicamento ALERCAS
Si se olvidó de tomar ALERCAS
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
Tome la dosis siguiente en su momento como le haya recetado su médico.

A tener en cuenta mientras toma ALERCAS
Efectos indeseables (adversos)
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Efectos secundarios frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
- Dolor de cabeza
- Somnolencia
- Nauseas
- Mareo

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)
- Cansancio
- Somnolencia

Otros efectos secundarios adicionales que pueden producirse son
- Dificultad para dormir (insomnio)
- Trastornos del sueño
- Pesadillas
- Nerviosismo
- Latidos del corazón rápidos o irregulares
- Diarrea
- Urticaria y picor
- Erupción
- Reacciones alérgicas graves que pueden causar hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, sofocos, opresión en el pecho y dificultad para respirar.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Cómo conservar ALERCAS?
- Conservar en lugar seco, desde 15 hasta 30° C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten. Sin T.A.C.C.