200 mm

150 mm

8753

DANLOX® RAPIDO

OMEPRAZOL, 20 mg; BICARBONATO DE SODIO; 1100 mg
OMEPRAZOL, 40 mg; BICARBONATO DE SODIO; 1100 mg

CÁPSULAS

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MÉDICO -

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **DANLOX RAPIDO** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula
DANLOX RAPIDO – Omeprazol 20 mg; Bicarbonato de sodio 1100 mg
Cada cápsula contiene:
Omeprazol 20 mg; Bicarbonato de sodio 1100 mg. Excipientes: croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

DANLOX RAPIDO – Omeprazol 40 mg; Bicarbonato de sodio 1100 mg
Cada cápsula contiene:
Omeprazol 40 mg; Bicarbonato de sodio 1100 mg. Excipientes: croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

¿Qué es* DANLOX RAPIDO *y para qué se usa?
DANLOX RAPIDO cápsulas contiene los principios activos conocidos como omeprazol y bicarbonato de sodio.
Omeprazol pertenece a una clase de medicamentos conocidos como "Inhibidores de la secreción ácida gástrica, antiulceroso y antiácido". El *bicarbonato* de sodio contenido en las cápsulas de **DANLOX RAPIDO** aumenta el pH del estómago y de este modo protege al omeprazol de la degradación ácida, mejorando así su disponibilidad. Se utiliza para el tratamiento de la úlcera duodenal activa, úlcera gástrica, reflujo gastroesofágico con síntomas, esofagitis erosiva diagnosticada por endoscopía y como tratamiento de mantenimiento de la esofagitis erosiva cicatrizada.

Antes de usar DANLOX RAPIDO
No tome **DANLOX RAPIDO**
- Si es alérgico (hipersensible) a omeprazol, bicarbonato de sodio o a cualquiera de los demás componentes de **DANLOX RAPIDO**.

Si alguna de estas situaciones le afecta, no tome este medicamento y consulte con su médico.

Tenga especial cuidado con DANLOX RAPIDO
- Ante la presencia de úlcera gástrica debe excluirse siempre el diagnóstico de cáncer gástrico ya que el tratamiento puede enmascarar los síntomas.
- Cada cápsula de **DANLOX RAPIDO** contiene 300 mg de sodio lo que ha de tenerse en cuenta en pacientes con dieta hiposódica (dieta con bajo contenido de sal).
- El bicarbonato de sodio está contraindicado en pacientes con alcalosis metabólica e hipocalcemia, debiendo utilizarse con precaución en pacientes con síndrome de Bartter (es un defecto genético raro en la porción gruesa del asa ascendente de Henle en el riñón. Se caracteriza por presentar hipopotasemia, alcalosis metabólica y presión arterial normal o baja) y alcalosis respiratoria. La administración prolongada de bicarbonato con leche o calcio puede provocar un síndrome lácteo-alcalino.
- Se recomienda disminuir la dosis en pacientes con insuficiencia hepática.

8753

E-8406-01 / D8753 / Act.: 02/2026

CASASCO

200 mm

150 mm

8753

Toma simultánea con otros medicamentos
El ketoconazol (antifúngico) disminuye su absorción durante el tratamiento con omeprazol u otros inhibidores de la secreción ácida, así como también la ampicilina y sales de hierro. Como el omeprazol se metaboliza a nivel hepático puede prolongar la vida media en sangre del diazepam (benzodiacepina), de la warfarina y de la fenitoína, ciclosporina y disulfiram, por lo que los pacientes que reciben estas drogas deben controlarse ante la necesidad de una eventual reducción de la dosis.
Las concentraciones plasmáticas de omeprazol y claritromicina se incrementan cuando se suministran en forma concomitante.

***¿Cómo tomar* DANLOX RAPIDO?**
Tome siempre **DANLOX RAPIDO** exactamente como le indique su médico. Esto le ayudará a conseguir los mejores resultados y disminuir el riesgo de efectos adversos. Su médico le indicará exactamente cuántas cápsulas de **DANLOX RAPIDO** debe tomar. Dependiendo de cómo responda usted al tratamiento, su médico puede sugerir aumentar o disminuir la dosis.
DANLOX RAPIDO debe ser ingerido una hora antes de la comida, con el estómago vacío. Teniendo en cuenta que tanto las cápsulas de 20 mg como las de 40 mg contienen 1.100 mg de bicarbonato de sodio, dos cápsulas de 20 mg no reemplazan a una cápsula de 40 mg, ya que duplica la dosis de bicarbonato. Las cápsulas sólo deben ser ingeridas con agua (no utilizar otro líquido) y no deben ser abiertas.
- Tratamiento de la úlcera duodenal activa a corto plazo: 20 mg una vez al día durante 4 semanas. Algunos pacientes requieren 4 semanas adicionales.
- Tratamiento de la úlcera gástrica: 40 mg una vez al día durante 4 a 8 semanas.
- Reflujo gastroesofágico sintomático: 20 mg una vez al día durante 4 semanas.
- Esofagitis erosiva: 20 mg. al día durante 4-8 semanas. No se ha establecido la eficacia de su utilización por más de 8 semanas.

Mantenimiento de esofagitis erosiva cicatrizada: 20 mg al día. Los estudios controlados realizados tuvieron una duración menor a 12 meses.
Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Embarazo y lactancia
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.
Debe informar a su médico si está embarazada, si sospecha que pudiera estarlo o si planea quedarse embarazada. **DANLOX** sólo debe administrarse en mujeres embarazadas en casos en que se considere imprescindible. Se han administrado hasta 80 mg durante 24 horas en parturientas sin que se hayan observado reacciones adversas en el niño.

Uso pediátrico
La seguridad y eficacia de omeprazol en pacientes pediátricos no ha sido establecida.

Uso en ancianos
Si bien no se requiere ajustar la dosis en pacientes añosos, tener en cuenta el impacto de la ingesta adicional de sodio y el aumento de la sensibilidad en algunos casos.

Si olvidó tomar DANLOX RAPIDO
Si olvida tomar una dosis, tómela siempre en ayunas y tan pronto como lo recuerde. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

A tener en cuenta mientras toma DANLOX RAPIDO
Efectos indeseables (adversos)
Al igual que todos los medicamentos, **DANLOX RAPIDO** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Habitualmente **DANLOX RAPIDO** es bien tolerado y las reacciones adversas son leves. Se han descripto los siguientes efectos adversos:
- Piel: rash o prurito en raras ocasiones, aisladamente fotosensibilidad, eritema multiforme y alopecia.

- Músculo esquelético: Raramente se ha descripto artralgias, mialgias, calambres y debilidad muscular.
- Sistema nervioso central y periférico: Ocasionalmente cefaleas y raramente somnolencia, insomnio, vértigo, parestesias y mareos, en casos aislados se ha observado depresión, agitación, confusión mental y alucinaciones.
- Aparato Gastrointestinal: Constipación, diarrea, náuseas y/o vómitos, flatulencia y dolor abdominal. En casos aislados, sequedad de boca, estomatitis y candidiasis gastrointestinal.
- Hepáticos: En forma muy rara se ha observado aumento de enzimas hepáticas. En casos aislados en pacientes con enfermedad hepática severa preexistente, hepatitis e insuficiencia hepática.
- Endocrinos: Ginecomastia en casos aislados (aumento del tamaño mamario en hombres).
- Hematológicos: Raramente se ha descripto leucopenia (disminución del número de glóbulos blancos en sangre), trombocitopenia (disminución del número de plaquetas en sangre), agranulocitosis y pancitopenia.
- Aparato Respiratorio: Raramente epitaxis (pérdida de sangre por nariz) y dolor faríngeo.
- Aparato Cardiovascular: Dolor de pecho, taquicardia, bradicardia, palpitaciones, hipertensión arterial.
- Urogenital: Infección urinaria, polaquiuria, dolor testicular, proteinuria, hematuria, glucosuria, aumento de la creatinina sérica.
- Metabólicos: Hiperglucemia (aumento de glucosa en sangre) y ganancia de peso.
- Otros tipos de efectos adversos: Malestar general, reacciones de hipersensibilidad (urticaria, angioedema, fiebre, broncoespasmo, nefritis intersticial) y shock anafiláctico, hiperhidrosis, edemas periféricos, visión borrosa, disgeusia (es una alteración del gusto en la boca).

***¿Cómo conservar* DANLOX RAPIDO?**
- Conservar a temperatura ambiente hasta 25 °C. Proteger de la humedad.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Fecha de última revisión: Junio de 2018

Esta especialidad medicinal está libre de gluten. Sin T.A.C.C.

Presentación:
Envases con 15 y 30 cápsulas.

Si Ud. ha tomado una dosis mayor de* DANLOX RAPIDO *de las que debiera
En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico.
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247 / 0800-444-8694.
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777 / 0800-333-0160.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas".
"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Certificado N ° 54.182
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

8753