

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

FÓRMULA

Cada sobre contiene:

Gérmenes muertos sometidos a vibración ultrasónica: *Streptococcus pneumoniae* 200 mill., *Branhamella catarrhalis* 200 mill., *Haemophilus influenzae* 100 mill., *Klebsiella pneumoniae* 200 mill., *Streptococcus respiratorios* (*St. sp. anhemoliticus* y *St. viridans*) 100 mill., *Micrococcus respiratorios* 200 mill., Ácido ascórbico 1,0 g. Excipientes: sacarina sódica 18,0 mg, ciclamato de sodio 135,0 mg, amarillo ocaso 0,4 mg, tartracina 0,2 mg, ácido cítrico 30,0 mg, sabor naranja en polvo 50,0 mg, dióxido de silicio coloidal 20,0 mg, azúcar c.s.p. 3,0 g.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Inmunoestimulante.

INDICACIONES

Inmunoterapia. Prevención de infecciones recurrentes de las vías respiratorias. Tratamiento adyuvante de las infecciones agudas de las vías respiratorias.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

El pool antígeno del lisado bacteriano contenido en **VACUNACE** estimula el sistema inmune a través del Sistema MALT (tejido linfoide asociado a las mucosas). El principal representante de este sistema son las placas de Peyer presentes en el intestino delgado. Los lisados bacterianos contienen estructuras moleculares llamadas PAMPS (Pathogen-associated molecular patterns) que son reconocidas por células del sistema inmune de las placas de Peyer a través de receptores llamados Toll Like receptores en particular el tipo 2 y 4. Estos a su vez se unen a proteínas adaptadoras que activan el factor de transcripción NF- κ B. Este factor se transloca al núcleo de la célula inmune y produce secreción de citokinas como interleukinas 1 β , interferón α y β y quemokinas.

La Vitamina C es una vitamina hidrosoluble antioxidante que tiene una acción favorecedora de la actividad de polimorfonucleares y macrófagos (quimiotaxis y función fagocítica).

FARMACOCINÉTICA

No se dispone de datos experimentales hasta el momento.

POSOLOGÍA

El contenido de un sobre disuelto en medio vaso de agua fría, en ayunas durante 8 días como mínimo. La duración total del tratamiento será determinada por el médico.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a los principios activos o excipientes de VACUNACE indicados en su composición.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

VACUNACE puede provocar reacciones de hipersensibilidad. Si estas reacciones se presentaran o si se presentan signos de intolerancia, se debe suspender su administración.

Los suplementos con Vitamina C pueden aumentar los niveles de oxalato urinario y elevar el riesgo de cálculos renales. No use **VACUNACE** con otros suplementos de Vitamina C.

Embarazo y lactancia: no hay información clínica disponible sobre el uso en mujeres embarazadas. Como medida preventiva, es recomendable evitar el uso de **VACUNACE** durante el embarazo. Con respecto a la lactancia, hasta el momento no se han realizado estudios clínicos específicos ni se han reportado datos al respecto. El producto debe ser administrado con precaución durante el embarazo y la lactancia.

Uso pediátrico: no se recomienda la administración de **VACUNACE** a niños menores de 6 meses debido a la inmadurez de su sistema inmunitario.

Interacciones medicamentosas: no se ha descripto ninguna interacción con otros medicamentos hasta la fecha.

REACCIONES ADVERSAS

Los efectos adversos más comunes son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y erupción cutánea.

Ante cualquier inconveniente con el producto puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentosos> llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

Asimismo, puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco S.A.I.C. a través de farmacovigilancia@casasco.com.ar.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



PRESENTACIONES

Envases con 20 y 30 sobres.

Fecha de última revisión: Marzo de 2022.

FORMA DE CONSERVACIÓN

- Conservar en su envase original en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15°C y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

Certificado N ° 33.998

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**