

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **VACUNACE** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada sobre contiene:

Gérmenes muertos sometidos a vibración ultrasónica: Streptococcus pneumoniae 200 mill., Branhamella catarrhalis 200 mill., Haemophilus influenzae 100 mill., Klebsiella pneumoniae 200 mill., Streptococcus respiratorios (St. sp. anhemoliticus y St. viridans) 100 mill., Micrococcus respiratorios 200 mill., Ácido ascórbico 1,0 g. Excipientes: sacarina sódica, ciclamato de sodio, amarillo ocaso, tartracina, ácido cítrico, sabor naranja en polvo, dióxido de silicio coloidal, azúcar.

¿Qué es VACUNACE y para qué se usa?

VACUNACE es un inmunoestimulante compuesto por lisados bacteriano de gérmenes comunes de infecciones respiratorias y Vitamina C.

VACUNACE se utiliza para la prevención de infecciones recurrentes de las vías respiratorias. También se usa como complementario de las infecciones agudas de las vías respiratorias.

Antes de usar VACUNACE

No use VACUNACE si

Es hipersensible a alguno de los principios activos o excipientes de **VACUNACE** indicados en su composición.

Tenga especial cuidado con VACUNACE

Toma simultánea de otros medicamentos

Los suplementos con Vitamina C pueden aumentar los niveles de oxalato urinario y elevar el riesgo de cálculos renales.

No se han descrito ninguna interacción con otros medicamentos hasta la fecha.

No use con otros suplementos de Vitamina C.

¿Cómo usar VACUNACE?

Disuelva el contenido de 1 sobre en ½ vaso de agua, agitando con una cucharita hasta su disolución total, en ayunas durante 8 días como mínimo.

La duración total del tratamiento será determinada por su médico.

Embarazo y lactancia: no hay información clínica disponible sobre el uso en mujeres embarazadas. Como medida preventiva, es recomendable evitar el uso de **VACUNACE** durante el embarazo. Con respecto a la lactancia, hasta el momento no se han realizado estudios clínicos específicos ni se han reportados datos al respecto. El producto debe ser administrado con precaución durante el embarazo y la lactancia.

Uso pediátrico: no se recomienda la administración de **VACUNACE** a niños menores de 6 meses debido a la inmadurez de su sistema inmunitario.

A tener en cuenta mientras toma VACUNACE

Efectos indeseables (adversos)

Los efectos adversos más comunes son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea y erupción cutánea.

¿Cómo conservar VACUNACE?

- Conservar en su envase original en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15°C y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Presentación

Envases con 20 y 30 sobres.

Fecha de última revisión: Agosto de 2019.

Si Ud. toma dosis mayores de VACUNACE de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

**“Ante cualquier inconveniente con el producto puede llenar la ficha que está en la
Página Web de la ANMAT <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos>
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.”**

**Asimismo, puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco
S.A.I.C. a través de farmacovigilancia@casasco.com.ar.**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 33.998

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**