BEMPLAS®

CLONIDINA CLORHIDRATO
CLORTALIDONA

COMPRIMIDOS

NFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
- CONSULTE A SU MÉDICO -

Venta Bajo Receta — Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar BEMPLAS y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula
Cada comprimido contiene:
Clonidina clorhidrato 0,075 mg, Clortalidona 50,000 mg. Excipiente: almidón de maíz, lactosa, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, azul patente.

¿Qué es BEMPLAS y para qué se usa?
BEMPLAS es un medicamento que contiene Clonidina, una droga que reduce el tono simpático central y la resistencia de los pequeños vasos a la circulación de la sangre, con disminución de la presión arterial. También contiene Clortalidona que es diurético que disminuye la reabsorción de sodio a nivel renal.
BEMPLAS se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial.

Antes de usar BEMPLAS
No use BEMPLAS si
• Es hipersensible a alguna de las drogas contenidas en BEMPLAS o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
• Tiene insuficiencia renal y/o hepática severa.
• Tiene sodio (hiponatremia) o potasio (hipokalemia) bajos en sangre, o si tiene el calcio (hipercalcemia) y/o ácido úrico (hiperuricemia) altos en sangre con síntomas.
• Padece bradicardia (lentitud del ritmo cardíaco) severa.
• Está embarazada o en periodo de lactación.
• Es menor de 12 años de edad.

Tenga especial cuidado con BEMPLAS
• Si aparece agitación, nerviosismo, cefalea, temblores y un rápido aumento de la presión arterial luego de suspender bruscamente el tratamiento con BEMPLAS
• Si aparecen dolores articulares ya que BEMPLAS puede aumentar el ácido úrico en sangre y producir un ataque de gota.
• Si tiene lípidos altos en sangre o trastornos con el azúcar de la sangre.
• Si tiene disminución de la función renal.
• Si tiene insuficiencia coronaria severa, trastornos de la conducción en el corazón, infarto de miocardio reciente, o accidente cerebrovascular.
• Si presenta alguna enfermedad que pueda disminuir el potasio en sangre (diarrea, cirrosis, vómitos, desnutrición, nefrosis, etc.)
• Si utiliza lentes de contacto dado que este medicamento puede disminuir el lagrimeo.

Toma simultánea de otros medicamentos
Informe a su médico si está consumiendo alguno de los siguientes medicamentos:

6018

• Alcohol, barbitúricos y sedantes sobre el Sistema Nervioso Central.
• Antidepresivos tricíclicos.
• Drogas que afectan la función del nódulo sinusal o la conducción auricular ventricular como digital, bloqueantes cálcicos y betabloqueantes.
• Amitriptilina.
• Litio.
• Antiinflamatorios no esteroides.
• Corticosteroides o ACTH.
• Carbenoxolona.
• Anfotericina.
• Derivados del curare
• Digital
• Insulina y/o hipoglucemiantes orales.

¿Cómo usar BEMPLAS?
La dosis recomendada de BEMPLAS es de 1/2 a 1 comprimido cada 12 ó 24 horas según la severidad de la hipertensión. Si va a suspender este medicamento consulte antes a su médico ya que debe hacerlo en forma gradual, nunca en forma brusca.

Embarazo y lactancia
Informe a su médico si está embarazada o planea estarlo. No se conseja el uso de BEMPLAS durante el embarazo o la lactancia.

Uso en niños
No debe usarse en menores de 12 años.

Uso en ancianos
Deben extremarse los recaudos con el uso de BEMPLAS en personas añosas ya que tienen una mayor propensión a padecer trastornos en el manejo del sodio, potasio y agua.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos
La clonidina contenida en BEMPLAS puede producir un efecto sedante, por lo cual no debe conducir automóviles u operar maquinarias complejas hasta saber que efecto produce este medicamento en usted.

Toma conjunta de BEMPLAS con alimentos y bebidas
La clonidina contenida en BEMPLAS puede potenciar los efectos del alcohol.

Uso apropiado del medicamento BEMPLAS
Si se olvidó de tomar BEMPLAS
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

A tener en cuenta mientras toma BEMPLAS
Efectos indeseables (adversos)
Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos son en su mayoría ligeros y tienden a disminuir al proseguir el tratamiento.

De acuerdo con su frecuencia, los efectos adversos relacionados a la clonidina son:
• Muy frecuentes (se presentan en más de 1 de cada 10 pacientes):
mareo, sedación, disminución de la tensión arterial con el cambio de posición de estar sentado a ponerse en pie (hipotensión ortostática) y sequedad de boca.
• Frecuentes (se presentan entre 1 y 10 de cada 100 pacientes):

depresión, trastornos del sueño, dolor de cabeza, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor en la glándula salival, dificultad para lograr o mantener una erección y cansancio.
• Poco frecuentes (se presentan entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes):
alucinaciones, pesadillas, sensación de hormigueo en la piel (parestesia), lentitud del ritmo cardíaco (bradicardia sinusal), bloqueo de la circulación de la sangre que produce dolor y cambios de color especialmente en los dedos de manos y pies (fenómeno de Raynaud), picor, erupción, urticaria y malestar.
• En casos raros (se presentan entre 1 y 10 de cada 10.000 pacientes):
aumento del tamaño de las mamas (ginecomastia), lagrimeo reducido, (bloqueo auriculoventricular), sequedad nasal, trastorno generalizado de los movimientos del intestino (pseudoobstrucción de colon), caída del pelo y niveles de azúcar en sangre aumentados. Los efectos adversos de frecuencia desconocida son confusión, disminución del deseo sexual, dificultad del ojo para enfocar y descenso del ritmo cardíaco (bradiarritmia).

De acuerdo con su frecuencia, los efectos adversos relacionados a la clortalidona son:
• Muy frecuentes
Principalmente a dosis más altas, hipocalemia (potasio bajo en sangre), hiperuricemia (elevación del ácido úrico) y elevación de lípidos sanguíneos.
• Frecuentes
Hiponatremia (sodio bajo en sangre), hipomagnesemia (magnesio bajo en sangre) e hiperglicemia (azúcar alta en sangre); urticaria y otras formas eruptivas; hipotensión ortostática (descenso de la presión al pararse) la cual puede agravarse por el alcohol, los anestésicos o los sedantes; vértigo; pérdida de apetito y molestias gastrointestinales menores; impotencia.
• Poco frecuentes
Hipercalcemia (potasio alto en sangre), glucosuria (perdida de azúcar por orina), empeoramiento del estado de diabetes metabólica y gota; trastorno de la visión fotosensibilización; trombocitopenia (plaquetas bajas en sangre), leucopenia (glóbulos blancos bajos en sangre), agranulocitosis y eosinofilia; ictericia (coloración amarillenta de la piel); arritmias cardíacas; parestesias; náusea leve y vómito, dolor gástrico, constipación y diarrea.
• Muy poco frecuentes
Alcalosis hipoclorémica; pancreatitis; edema pulmonar idiosincrático (trastornos respiratorios), nefritis intersticial alérgica y vasculitis.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Cómo conservar BEMPLAS?
- Conservar en lugar fresco y seco preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación
Envases con 30 y 60 comprimidos.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.

Fecha de última revisión: diciembre de 2018.

Si Ud. toma dosis mayores de BEMPLAS de las que debiera
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

6018

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
Centro de asistencia toxicológica de La Plata: (0221) 451-5555.

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas".
"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Certificado N° 34.355
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

E-5682-01 / D6018 / Act. 01/2023

CASASCO

6018