TOFLUX ®

N-ACETILCISTEÍNA 200 mg
PROSPECTO PARA EL USUARIO

Granulado
Vía de Administración: Oral

Venta Libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer. Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE TOFLUX?

Cada sobre contiene:

Ingrediente activo: N-acetilcisteína 200,00 miligramos.

Ingredientes inactivos: povidona K-30; sucralosa; esencia de frutilla en polvo; ácido cítrico anhidro; hidroxipropilcelulosa; manitol.

ACCIÓN:

N-acetilcisteína pertenece al grupo de medicamentos denominados mucolíticos.

Actúa disminuyendo la viscosidad del moco, fluidificándolo y facilitando su eliminación.

¿PARA QUÉ SE USA TOFLUX?

Este medicamento está indicado para facilitar la eliminación del exceso de moco y flemas, en procesos catarrales y gripales en adultos y mayores de 14 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR TOFLUX?

- Si es alérgico a la N-acetilcisteína o a cualquiera de sus componentes.
- Si padece úlcera de estómago o duodeno.
- Menores de 14 años.
- Si está embarazada o dándole el pecho a su bebé.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento:

- Si es usted asmático o padece una enfermedad respiratoria grave.
- El posible olor azufrado (a huevos podridos) del medicamento es propio del principio activo, pero no indica que el medicamento esté en malas condiciones.
- Si al tomar el medicamento observa molestias en el estómago suspender el tratamiento y consultar al médico. Se recomienda precaución en caso de pacientes con úlcera péptica o antecedentes de úlcera péptica.
- Durante los primeros días de tratamiento podrá observar un aumento de mocos y flemas, que irá disminuyendo a lo largo del tratamiento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Como todos los medicamentos la N-acetilcisteína puede producir efectos adversos. Ocasionalmente pueden aparecer molestias digestivas como ardor estomacal, náuseas, vómitos, diarrea. Raramente pueden observarse somnolencia, dolor de cabeza, erupción cutánea y fiebre.

Raramente se presentan reacciones de hipersensibilidad (alergia), acompañadas de urticaria y broncoespasmos, caso en el que se recomienda interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Si Ud. está embarazada o dando de mamar a su bebe, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Si está tomando otro medicamento para alguna enfermedad crónica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
La administración conjunta:

- Con Nitroglicerina (medicamento para el corazón) puede producir dolor de cabeza e hipotensión.
- Con Carbamazepina (anticonvulsivante) puede producir una disminución de la eficacia de la misma.
- Con medicamentos antitusivos (para la tos) o con aquéllos que disminuyen las secreciones bronquiales (como los antihistamínicos y los anticolinérgicos) puede provocar un acumulo de moco fluidificado.
- Si está tomando algún medicamento que contenga minerales como el hierro o calcio, o algún antibiótico tipo (anfotericina B, ampicilina sódica, cefalosporinas, lactobionato, eritromicina y algunas tetraciclinas) debe separar su toma de la toma de N-acetilcisteína al menos 2 horas.

No se recomienda la disolución de N-acetilcisteína con otros medicamentos.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?
Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.
La dosis recomendada es:
Adultos y mayores de 14 años
1 sobre de 200 miligramos tres veces por día durante cinco días.
No superar la dosis de 3 sobres por día.
Debe consultar a su médico si los síntomas no mejoran o empeoran después de 3 días de tratamiento.
Cómo tomar TOFLUX:
Toflux se toma por vía oral.
Volcar el contenido de un sobre en medio vaso de agua revolver hasta que se disuelva en forma completa el polvo y luego beber.
Se recomienda beber abundante cantidad de líquido durante el día.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MASCERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767
Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?
Comuníquese a los siguientes teléfonos:
ANMAT Responde: 0800 333 1234

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT https://vigiflow-eforms.who-mc.org/ar/medicamentos o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234. Asimismo, puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco S.A.I.C. a través de farmacovigilancia@casasco.com.ar

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

PRESENTACIÓNES: Envases conteniendo 10 sobres.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten

Fecha de última revisión: Junio de 2026.

Forma de conservación:

- Conservar en su envase original a temperatura ambiente menor a 30ºC. Proteger del calor y la humedad.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.
Certificado N ° 56.547
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

CASASCO