

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar COMINAR y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque presenten los mismos síntomas de enfermedad que usted, ya que puede perjudicarlos.

Fórmula

Cada cápsula contiene:

Diacereína 50,0 mg. Excipientes: lactosa, povidona K-30, croscarmelosa sódica, polisorbato 80, estearato de magnesio.

¿Qué es COMINAR y para qué se usa?

COMINAR es un medicamento que contiene diacereína, una sustancia que se usa para aliviar los síntomas de la osteoartritis de cadera o rodilla.

COMINAR se usa en el tratamiento sintomático de la artrosis, y necesita algún tiempo para hacer efecto, por lo tanto, no está recomendado para una forma específica de osteoartritis de cadera llamada osteoartritis de cadera rápidamente progresiva (destruktiva).

Antes de usar COMINAR.

No use COMINAR si

- Es alérgico a la diacereína, a sustancias similares o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Padece determinadas enfermedades del intestino denominadas colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.
- Padece alguna enfermedad grave del hígado o antecedentes de problemas en el hígado.
- Tiene alguna enfermedad que altera el funcionamiento de los riñones.
- Tiene diarrea.

Tenga especial cuidado con COMINAR

- Si usted ha padecido o padece cualquier enfermedad de los riñones o del hígado.
- Algunos pacientes pueden presentar deposiciones sueltas o diarrea después de tomar COMINAR. Si sufre diarrea mientras toma este medicamento, deje de tomarlo y consulte a su médico para buscar una alternativa de tratamiento.
- Se han notificado problemas del hígado incluyendo aumento de las enzimas hepáticas en la sangre y hepatitis (inflamación del hígado) en algunos pacientes que toman diacereína. Su médico puede pedirle que se realice análisis de sangre para monitorear la función del hígado.

Consulte a su médico antes de empezar a tomar COMINAR.

Toma simultánea de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Durante el tratamiento con COMINAR no debe tomar laxantes.

No se recomienda la administración conjunta de medicamentos para molestias de estómago tales como antiácidos derivados de magnesio, aluminio y calcio porque pueden disminuir la absorción digestiva de diacereína.

COMINAR no debe administrarse al mismo tiempo con drogas o sustancias que modifican el tránsito intestinal por ejemplo fibras o fibratos (fenofibrato, benzafibrato, etc).

COMINAR puede causar aumento de los trastornos intestinales en aquellos pacientes bajo tratamiento con antibióticos y/o quimioterapia, que puedan afectar la flora intestinal.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Debido a la falta de experiencia clínica, no se aconseja tomar este medicamento durante el embarazo. La diacereína, como los fármacos de su mismo grupo, puede aparecer en la leche materna, por lo que se recomienda no tomar este medicamento durante la lactancia.

Uso apropiado de COMINAR

¿Cómo usar COMINAR?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda consulte de nuevo a su médico.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con COMINAR. No suspenda el tratamiento antes, ya que no se obtendrían los resultados esperados.

COMINAR es un medicamento que presenta un inicio lento de acción, pero cuyos efectos perduran bastantes días después de que se haya suprimido el tratamiento. Precisamente por el retraso en su acción inicial, debe tomarse ininterrumpidamente durante al menos 1 mes para empezar a observar sus efectos beneficiosos y puede asociarse a antiinflamatorios o analgésicos durante las primeras semanas de tratamiento para ayudar a controlar los síntomas.

Si estima que la acción de COMINAR es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico.

El inicio del tratamiento en adultos es de 1 cápsula (50 mg de diacarina) 1 vez al día por la noche durante las primeras 2 a 4 semanas, después se puede aumentar la dosis a dos cápsulas por día. La dosis máxima recomendada es de 1 cápsula 2 veces al día (100 mg de diacarina).

Las cápsulas se tomarán enteras, con un poco de líquido, con las comidas principales.

Uso en niños

El uso de COMINAR está contraindicado en niños.

Uso en ancianos

No se recomienda el uso de COMINAR en pacientes mayores de 65 años.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

Toma conjunta de COMINAR con alimentos y bebidas

Se aconseja ingerir las cápsulas de COMINAR junto con las comidas.

El consumo de alcohol durante el tratamiento con COMINAR puede aumentar el daño de su hígado, por lo cual debe limitar el consumo de alcohol durante el tratamiento.

Si olvidó tomar COMINAR

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Continúe el tratamiento con la siguiente dosis a su hora habitual.

A tener en cuenta mientras toma COMINAR

Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos, COMINAR puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Informe a su médico inmediatamente y deje de tomar COMINAR si sufre deposiciones líquidas o acuosas inusualmente frecuentes. En algunos casos, la diarrea puede ser grave con complicaciones potencialmente mortales como trastornos por pérdida de líquido y electrolitos.

Informe a su médico inmediatamente en caso de sufrir dolor abdominal, ictericia (coloración amarilla de los ojos o la piel), alteración de la consciencia o picazón de la piel, ya que pueden indicar problemas graves como enfermedad del hígado.

Los efectos adversos se clasifican en:

- *Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):* dolor abdominal, deposiciones blandas y diarrea. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, estos efectos secundarios han sido bien tolerados y tienden a desaparecer a las 2-3 semanas de iniciado el tratamiento. Coloración oscura de la orina.
- *Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):* movimientos intestinales frecuentes, flatulencia, escozor, erupción en la piel y eczema (sarpullido rojo con picor).
- Rara vez (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas) aparece una pigmentación de la mucosa del intestino (melanosis cólica).
- Dadas las características de la diacereína, en algunos casos, puede aparecer un oscurecimiento o una coloración fuerte de la orina que carece de importancia.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Cómo conservar COMINAR?

- Conservar en su envase original desde 15°C hasta 30°C. Proteger de la humedad.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentaciones

Envases con 30 y 60 cápsulas.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Septiembre de 2026

Si ud toma dosis mayores de COMINAR de las que debiera

Si usted ha tomado más COMINAR de lo que debe, puede producirse una diarrea muy intensa. Consulte inmediatamente a su médico quien le aconsejará sobre las medidas a adoptar.

En caso de sobredosis, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico.,

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomienda a otras personas”.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

**<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”**

**Asimismo, puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco
S.A.I.C. a través de farmacovigilancia@casasco.com.ar.**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 47.271

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

