

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **OTEVIL** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas

OTEVIL 16 mg

Betahistina diclorhidrato 16 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, anhídrido silícico coloidal, almidón pregelatinizado, estearato magnésico, croscarmelosa sódica, lauril sulfato de sodio anhidro.

OTEVIL 24 mg

Betahistina diclorhidrato 24 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, anhídrido silícico coloidal, almidón pregelatinizado, estearato magnésico, croscarmelosa sódica, lauril sulfato de sodio anhidro.

¿Qué es OTEVIL y para qué se usa?

OTEVIL pertenece a un grupo de medicamentos llamados fármacos antivertiginosos.

OTEVIL se utiliza para el tratamiento del Síndrome de Menière, trastorno que se caracteriza por presentar los siguientes síntomas: vértigos (con náuseas y vómitos), pérdida de audición y acúfenos (sensación de ruidos dentro del oído).

Antes de usar OTEVIL

No use OTEVIL si

- Si es alérgico (hipersensible) al principio activo betahistina o a cualquiera de los componentes.
- Si tiene un determinado cáncer de las glándulas suprarrenales llamado feocromocitoma.

Tenga especial cuidado con OTEVIL

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar OTEVIL, si padece o ha padecido alguna enfermedad o síntoma, especialmente cualquiera de las siguientes:

- Si tiene asma bronquial.
- Si tiene o ha tenido úlcera de estómago.
- Si sufre ronchas en la piel y picor interno (urticaria), erupción cutánea (exantema) o fiebre del heno.
- Si tiene la presión arterial muy baja.
- Si está en tratamiento con medicamentos para la alergia (antihistamínico), al mismo tiempo que toma betahistina.

Toma simultánea de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Debe informar al médico en caso de tratamiento simultáneo con los siguientes medicamentos:

- La administración de medicamentos antialérgicos como los antihistamínicos (en especial los antagonistas H1) al mismo tiempo puede reducir la eficacia de ambos medicamentos.

- Inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO) utilizados para tratar la depresión.

Toma de OTEVIL con los alimentos y bebidas

Se recomienda tomar OTEVIL durante o después de las comidas para evitar molestias gástricas.

¿Cómo usar OTEVIL?

Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico. Ante cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico.

La dosis deberá ajustarse de forma individualizada en cada paciente en función de la respuesta al tratamiento, siendo la pauta posológica recomendada:

Adultos

Comprimidos de 16 mg: La dosis inicial es de medio comprimido de 16 mg tres veces al día. La dosis máxima diaria 48 mg, repartida en 3 tomas.

En algunos casos, la mejoría no comienza a hacerse evidente hasta las dos semanas del inicio del tratamiento. El resultado óptimo se obtiene tras varios meses de tratamiento.

Comprimidos de 24 mg: La dosis inicial recomendada es de 24 mg una vez al día. La dosis máxima diaria es de 48 mg repartidos en dos tomas.

Uso en niños y adolescentes menores de 18 años

Betahistina no está recomendado para uso en niños y adolescentes menores de 18 años debido a que no existe experiencia en estos grupos de edad.

Ancianos

No se requieren precauciones especiales en ancianos, pudiéndose emplear las mismas dosis que en adultos.

Insuficiencia renal

A pesar de que no existen estudios específicos en pacientes con insuficiencia renal y dado que la principal vía de eliminación de la betahistina es la renal, es recomendable su uso con precaución en este grupo de pacientes.

Insuficiencia hepática

No existen estudios específicos en pacientes con insuficiencia hepática, sin embargo, la administración de betahistina durante períodos superiores a 60 días no produjo alteración de las enzimas hepáticas. Se recomienda su uso con precaución en este grupo de pacientes.

Embarazo

Se recomienda una evaluación del balance beneficio/riesgo antes de su prescripción de betahistina a mujeres embarazadas.

Lactancia

La betahistina se excreta por la leche materna. Por ello no se recomienda su uso durante el período de lactancia.

Conducción y uso de máquinas

La influencia de la betahistina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas se considera nula o insignificante.

Uso apropiado del medicamento OTEVIL

Si se olvidó de tomar OTEVIL

Si accidentalmente olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. No tome dos dosis el mismo día. Luego tome la dosis siguiente en el horario habitual.

A tener en cuenta mientras toma OTEVIL

Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos OTEVIL puede producir efectos indeseables, aunque no todos los pacientes las experimentan.

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Muy frecuentes: en más de 1 de cada 10 pacientes.

Frecuentes: entre 1 y 10 de cada 100 pacientes.

Poco frecuentes: entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes.

Raros: entre 1 y 10 de cada 10.000 pacientes.

Muy raros: en menos de 1 de cada 10.000 pacientes.

Frecuencia no conocida: no puede estimarse a partir de los datos disponibles.

Trastornos gastrointestinales

En algunos casos se han observado molestias gástricas ligeras, que pueden aliviarse si la ingesta del fármaco se realiza de forma concomitante con las comidas o disminuyendo la dosis.

Frecuentes: náuseas y dispepsia.

Raros: dolor y molestias en el estómago, hinchazón abdominal, vómitos.

Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo

Muy raros: erupción cutánea, picazón, ronchas en la piel y picor intenso (urticaria).

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

¿Cómo conservar OTEVIL?

- Conservar en su envase original, desde 15°C hasta 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Septiembre de 2026.

Presentación

Envases con 30 y 60 comprimidos.

Si Ud. toma dosis mayores de OTEVIL de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

Asimismo, puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco S.A.I.C. a través de farmacovigilancia@casasco.com.ar.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 55.324

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

