

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **ISOBLOC CR** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas

Cápsulas de liberación prolongada x 20 mg

Cada cápsula de liberación prolongada contiene:

Carvedilol fosfato (como hemihidrato) 20 mg. Excipientes: óxido de polietileno; hidroxipropilmetilcelulosa K4; povidona K30; fosfato tricálcico; butilhidroxitolueno; almidón pregelatinizado; dióxido de silicio coloidal; talco; estearato de magnesio; crospovidona; celulosa microcristalina; almidón glicolato de sodio.

Cápsulas de liberación prolongada x 40 mg

Cada cápsula de liberación prolongada contiene:

Carvedilol fosfato (como hemihidrato) 40 mg. Excipientes: óxido de polietileno; hidroxipropilmetilcelulosa K4; povidona K30; fosfato tricálcico; butilhidroxitolueno; almidón pregelatinizado; dióxido de silicio coloidal; talco; estearato de magnesio; crospovidona; celulosa microcristalina; almidón glicolato de sodio.

¿Qué es ISOBLOC CR y para qué se usa?

ISOBLOC CR es un medicamento que contiene cápsulas de carvedilol de liberación extendida. El carvedilol pertenece a las drogas llamadas betabloqueantes y tiene un efecto antihipertensivo y antianginoso. Está indicado para el tratamiento de ciertas condiciones en:

- pacientes con presión alta en la sangre (hipertensión),
- pacientes con cierto tipo de insuficiencia cardíaca,
- pacientes que tuvieron un ataque al corazón que empeoró la capacidad de bombear del corazón.

ISOBLOC CR no está aprobado para uso en menores de 18 años.

Antes de usar ISOBLOC CR

No use ISOBLOC CR si

- Tiene alergia reconocida al carvedilol o a cualquiera de los componentes de las cápsulas de carvedilol de liberación extendida.
- Tiene latidos cardíacos lentos (menos de 45-50 latidos cardíacos por minuto), o ciertas alteraciones especiales que causan que el corazón saltee un latido (latidos cardíacos irregulares).
- Tiene insuficiencia cardíaca severa que requiera tratamiento con drogas inotrópicas intravenosas que ayudan a mantener la circulación.
- Tiene asma o problemas respiratorios.
- Tiene problemas hepáticos.

Tenga especial cuidado con ISOBLOC CR

- Si presenta problemas con el flujo de la sangre en los pies y piernas (enfermedad vascular periférica).
- Si ha tenido reacciones alérgicas severas
- Si tiene programada una cirugía que se le administrarán agentes anestésicos

- Si tiene diabetes ya que el carvedilol puede atenuar los síntomas de hipoglucemia, especialmente la taquicardia (frecuencia cardíaca elevada).
- Si tiene asma u otros problemas respiratorios (tales como bronquitis o enfisema)
- Si tiene problemas tiroideos
- Si tiene una condición llamada feocromocitoma.
- Si tiene programada una cirugía de cataratas y ha tomado o está tomando carvedilol de liberación extendida.
- Si está embarazada o está intentando quedar embarazada. No se sabe si las cápsulas de carvedilol de liberación extendida son seguras para su bebé por nacer. Hable con su médico sobre la mejor forma de controlar su presión de la sangre durante el embarazo.
- Si está en período de lactancia. No se sabe si las cápsulas de carvedilol de liberación extendida pasan a la leche materna. Hable con su médico sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si está tomando cápsulas de carvedilol de liberación extendida.

Toma simultánea de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. En particular si está utilizando alguno de los siguientes:

- agentes anestésicos: éter, ciclopropano, tricloroetileno.
- Fluoxetina y paroxetina (drogas antidepresivas).
- Quinidina.
- Propafenona.
- Inhibidores de la monoaminooxidasa.
- Reserpina y Clonidina (drogas para bajar la presión).
- Ciclosporina (droga inmunosupresora).
- Digoxina (droga para tratar la insuficiencia cardíaca).
- Rifampicina (antibiótico).
- Verapamilo y diltiazem (Bloqueantes de los canales de calcio usados como antianginosos e hipotensores).
- Insulina o hipoglucemiantes orales.
- Amiodarona.

¿Cómo usar ISOBLOC CR?

ISOBLOC CR está formulado en cápsulas de liberación extendida que se deben tomarse una vez por día en la mañana, con alimentos. Es importante que tome las cápsulas de liberación extendida únicamente una vez cada día. Las cápsulas deben tragarse enteras y su contenido no debe triturarse, masticarse ni tomarse en dosis divididas.

Si tiene problemas para tragar las cápsulas enteras, una forma alternativa de tomarla es abrir la capsula cuidadosamente para espolvorear los gránulos sobre una cucharada de puré de manzanas. El puré de manzanas no debe estar tibio porque, de esa manera, se podría afectar la liberación prolongada de esta formulación. La mezcla del medicamento y el puré debe consumirse inmediatamente y en su totalidad. La mezcla del medicamento con el puré no debe guardarse para uso futuro. No disemine las bolitas en otra comida que no sea el puré de manzanas.

Si usted está tomando comprimidos de carvedilol de liberación inmediata, podrá cambiarlo por **ISOBLOC CR** cápsulas de liberación controlada según indicaciones y equivalencias que le dará su médico.

Tome las cápsulas de ISOBLOC CR exactamente como se la indicó su médico.

Insuficiencia cardíaca: la dosis debe ser individualizada y controlada estrechamente por su médico durante el ajuste ascendente de dosis. La dosis inicial recomendada de carvedilol es de 10 mg una vez por día durante 2 semanas. Si usted tolera la dosis de 10 mg una vez por día, su médico se la podrá aumentar a 20, 40 y 80 mg en intervalos sucesivos de, por lo menos, 2 semanas.

Al inicio del tratamiento y, en menor medida, con los aumentos de dosis podrán aparecer síntomas temporarios de mareos (y, raramente, síncope) dentro de la primera hora posterior a la administración. Por lo tanto, durante estos períodos, evite conducir o realizar tareas riesgosas.

Disfunción ventricular izquierda después de un infarto de miocardio: la dosis debe ser individualizada y controlada durante el ajuste ascendente de dosis. Su médico podrá iniciarle el tratamiento con **ISOBLOC CR** mientras está hospitalizado o en forma ambulatoria. Se recomienda como dosis de inicio de **ISOBLOC CR** 20 mg una vez por día. Su médico podrá aumentar la dosis entre los 3 y los 10 días posteriores, según su tolerancia, hasta 40 mg una vez por día y luego, hasta 80 una vez por día.

Hipertensión: la dosis debe ser individualizada. La dosis inicial recomendada de **ISOBLOC CR** es de 20 mg una vez por día. Si esta dosis es tolerada, utilizando como guía los valores de presión sistólica de pie medida alrededor de 1 hora después de la toma, la dosis debe mantenerse durante 7 a 14 días y luego, aumentarse hasta 40 mg una vez por día si es necesario (también según la presión arterial sistólica de pie una hora después de la toma). Esta dosis también debe mantenerse durante 7 a 14 días y luego, puede ajustarse en forma ascendente hasta 80 mg una vez por día, si se tolera y se necesita.

Puede esperarse que la coadministración de **ISOBLOC CR** con diuréticos produzca efectos aditivos y exacerbe el componente ortostático de su efecto.

Embarazo y lactancia

El uso de drogas betabloqueantes (a las cuales pertenece el carvedilol) durante el embarazo se ha asociado con retardo del crecimiento fetal y ocasionalmente bradicardia en el recién nacido. Su médico deberá valorar el riesgo-beneficio de administrar carvedilol durante el embarazo.

No se sabe con seguridad si el carvedilol pasa a la leche materna por lo que se aconseja suspender la lactancia durante la administración de esta droga.

Uso en niños

ISOBLOC CR no debe usarse en menores de 18 años edad.

Uso en ancianos

Cuando se cambie de altas dosis de comprimidos de carvedilol de liberación inmediata (25 mg dos veces por día) a cápsulas de carvedilol de liberación extendida (40 mg), se recomienda iniciar con una dosis menor de carvedilol de liberación extendida para minimizar el potencial de mareos, síncope o hipotensión.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

Reacciones individuales como sentirse mareado, cansado o débil pueden comprometer la capacidad de conducir automóviles o para manejar maquinarias.

Toma conjunta de ISOBLOC CR con alimentos y bebidas

Carvedilol de liberación controlada debe administrarse con las comidas.

Uso apropiado del medicamento ISOBLOC CR

No pare de tomar las cápsulas de carvedilol de liberación extendida y no cambie la cantidad que toma sin hablar con su médico.

Si se olvidó de tomar ISOBLOC CR

Es importante que tome **ISOBLOC CR** como su médico le haya indicado. Si olvida una dosis tómela tan pronto como lo recuerde, a menos que se encuentre próximo a la hora de la próxima toma. En ese caso

límitese a reanudar el régimen habitual al día siguiente. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

A tener en cuenta mientras toma ISOBLOC CR

Efectos indeseables (adversos)

Los efectos adversos serios de las cápsulas de carvedilol de liberación extendida pueden incluir:

- Dolor en el pecho y ataque cardíaco si deja de tomar repentinamente las cápsulas de liberación extendida de carvedilol.
- Ritmo cardíaco lento.
- Presión arterial baja (que puede causar mareos o desmayos al ponerse de pie). Si esto ocurre, siéntese o acuéstese e informe a su médico de inmediato.
- Empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Informe a su médico de inmediato si presenta signos y síntomas de que su insuficiencia cardíaca podría estar empeorando, como aumento de peso o mayor dificultad para respirar.
- Cambios en el nivel de azúcar en la sangre. Si tiene diabetes, informe a su médico si presenta algún cambio en sus niveles de azúcar en la sangre.
- Enmascaramiento de los síntomas de hipoglucemia, especialmente latido cardíaco acelerado.
- Síntomas nuevos o empeoramiento de la enfermedad vascular periférica:
 - Dolor en las piernas al caminar, que desaparece al descansar.
 - Entumecimiento en las piernas o los pies al descansar.
 - Piernas o pies fríos.
- Enmascaramiento de los síntomas del hipertiroidismo (tiroides hiperactiva), como latidos cardíacos acelerados.
- Empeoramiento de reacciones alérgicas graves. Los medicamentos para tratar una reacción alérgica grave pueden no ser tan efectivos mientras esté tomando cápsulas de liberación extendida de carvedilol.
- Se han producido reacciones alérgicas raras pero graves (como urticaria o hinchazón de la cara, los labios, la lengua y/o la garganta, que pueden causar dificultad para respirar o tragar) en pacientes que tomaban comprimidos de carvedilol de liberación inmediata o cápsulas de carvedilol de liberación extendida. Estas reacciones pueden ser potencialmente mortales. En algunos casos, estas reacciones se presentaron en pacientes que habían tomado comprimidos de carvedilol de liberación inmediata antes de comenzar a tomar cápsulas de carvedilol de liberación extendida.

Los efectos secundarios comunes de las cápsulas de liberación extendida de carvedilol incluyen dificultad para respirar, aumento de peso, diarrea y cansancio. Si usa lentes de contacto, puede experimentar menos lágrimas o sequedad ocular, lo cual puede resultar molesto.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten



¿Cómo conservar ISOBLOC CR?

- Conservar en su envase original a temperatura menor a 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 30 cápsulas de liberación prolongada.

Fecha de última revisión: Agosto de 2026.

Si Ud. toma dosis mayores de ISOBLOC CR de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

Asimismo, puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco S.A.I.C. a través de farmacovigilancia@casasco.com.ar.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 42.605

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

