

Comprimidos: **BETAMETASONA, 0,250 mg; LORATADINA, 5,000 mg**

Comprimidos – Solución Oral

Solución Oral: **BETAMETASONA, 0,050 mg; LORATADINA, 1,000 mg**

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CONSULTE A SU MÉDICO

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **CORTICAS L** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmulas

Comprimidos

Cada comprimido contiene:

Betametasona 0,250 mg, Loratadina 5,000 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa, croscarmelosa sódica, povidona K30, carboximetilcelulosa cálcica, almidón de maíz.

Solución oral

Cada ml contiene:

Betametasona 0,050 mg, Loratadina 1,000 mg. Excipientes: propilenglicol, benzoato de sodio, ciclamato de sodio, sacarina sódica, glicerina, ácido cítrico anhidro, esencia de frutilla, sorbitol solución 70%, azúcar, agua purificada.

¿Qué es CORTICAS L y para qué se usa?

Es un medicamento que contiene un corticoide, la betametasona, y un antihistamínico la loratadina tiene una acción antialérgica antiinflamatoria y antihistamínica. Se utiliza para el tratamiento de distintas afecciones alérgicas: de la piel (dermatitis alérgica, dermatitis de contacto, urticaria), rinitis, conjuntivitis, reacciones alérgicas por alimentos y medicamentos.

Antes de tomar CORTICAS L

No tome CORTICAS L

- Si tiene hipersensibilidad demostrada a alguno de los componentes de este medicamento.
- Si tiene infecciones generalizadas por hongos.
- Si va a vacunarse contra la viruela.
- Si va hacer otro tipo vacunación especialmente a dosis elevadas.

Tenga especial cuidado con CORTICAS L

Debe contarle a su médico:

- Si tiene disminución de la función tiroidea.
- Si tiene cirrosis o insuficiencia hepática grave.
- Si tiene colitis ulcerosa inespecífica, diverticulitis con riesgo de perforación o una operación de anastomosis (unión) intestinal reciente.
- Si tiene úlcera gástrica activa o latente.
- Si tiene insuficiencia renal.
- Si tiene hipertensión arterial.

- Si tiene herpes simple ocular.
- Si tiene osteoporosis.
- Si tiene una enfermedad muscular debilitante llamada miastenia gravis.
- Si quedo expuesto a varicela o sarampión. Esto es particularmente importante en niños.
- Si tiene Diabetes.
- Si tiene tuberculosis activa o latente.

Toma simultánea de otros medicamentos

CORTICAS L puede afectar la acción de otras drogas así como otras drogas pueden afectar la acción de **CORTICAS L**.

Informe a su médico si está utilizando ha utilizado o podría utilizar cualquier otro medicamento especialmente:

- Anticonvulsivos como fenobarbital y fenitoína.
- Efedrina.
- Rifampicina.
- Glucósidos cardíacos (digitálicos).
- Antiinflamatorios.
- Ácido acetilsalicílico (aspirina) o salicilatos.
- Anticoagulantes de tipo cumarínico.
- Eritromicina.
- Ketoconazol.
- Cimetidina.
- Drogas para el tratamiento de la diabetes.

¿Cómo tomar CORTICAS L?

Las dosis requeridas son variables y deben ser determinadas individualmente por el médico tratante de acuerdo a la enfermedad específica, su gravedad y la respuesta al tratamiento.

En general la dosis recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es de 1 comprimido dos veces por día. Para los niños de hasta 12 años, solución oral:

Niños de 2 a 12 años con peso corporal mayor de 30 kg: 10 ml, 1 vez por día.

Niños de 2 a 12 años con peso corporal igual o menor de 30 kg: 5 ml, 1 vez por día.

Niños mayores de 12 años y adultos: 10 ml de solución oral una vez por día.

Se puede tomar con o sin alimentos. Sin embargo, en el caso de la solución oral se recomienda administrar la medicación con el estómago vacío.

Embarazo y lactancia

No se recomienda el uso de **CORTICAS L** durante el embarazo o la lactancia. El médico evaluará los riesgos potenciales de su administración.

Uso en niños

Debe vigilarse el crecimiento y desarrollo de niños que reciben corticoides ya que estos pueden alterar la velocidad de crecimiento.

Si se olvidó de tomar CORTICAS L

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Continúe el tratamiento con la siguiente dosis a su hora habitual.

A tener en cuenta mientras toma *CORTICAS L*

Efectos indeseables (adversos)

A las dosis recomendadas **CORTICAS L** no posee efectos sedantes significativos.

Los efectos adversos más comúnmente informados con la loratadina incluyen fatiga, dolor de cabeza, somnolencia, nerviosismo, boca seca, trastornos gastrointestinales, tales como náuseas y gastritis, y síntomas alérgicos del tipo erupción.

En adición a los eventos mencionados, se han comunicado los siguientes efectos adversos en el 2% o menos de los pacientes:

Sistema cardiovascular: aumento o disminución de la presión arterial, palpitaciones, síncope, aumento de la frecuencia cardíaca.

Sistema gastrointestinal: malestar abdominal, náuseas, vómitos, flatulencia, gastritis, constipación, diarrea, alteración del gusto, aumento o disminución del apetito, trastornos de la digestión después de las comidas, inflamación bucal, dolor dental.

Psiquiátricos: ansiedad, depresión, agitación, insomnio, pesadillas, pérdida de la memoria, alteración de la concentración, confusión, disminución del deseo sexual, nerviosismo.

Piel y faneras: inflamación de la piel, pelo seco, piel seca, urticaria, erupción, picazón, reacciones a la luz, manchas violáceas en la piel.

Las reacciones adversas a la betametasona son similares a las comunicadas con otros corticosteroides y se relacionan con la dosis y la duración del tratamiento. Habitualmente, las mismas pueden ser revertidas o minimizadas disminuyendo la dosis; en general, esto es preferible a la interrupción del tratamiento.

Trastornos hidroelectrolíticos: retención de sodio, pérdida de potasio, alcalosis hipopotasémica; retención de líquido; insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes susceptibles; aumento de presión arterial.

Osteomusculares: debilidad muscular, pérdida de masa muscular; agravamiento de los síntomas en casos de enfermedad muscular (miastenia gravis); osteoporosis; fracturas por compresión vertebral; necrosis aséptica de la cabeza femoral y humeral, fracturas patológicas de los huesos largos; ruptura de tendones.

Gastrointestinales: úlcera gástrica con posibilidad de perforación y hemorragia subsecuente; inflamación del páncreas, distensión abdominal; esofagitis ulcerosa.

Dermatológicas: alteración en la cicatrización de heridas, atrofia cutánea, adelgazamiento y fragilidad de la piel; manchas hemorrágicas puntiformes en la piel (pequeñas y grandes); enrojecimiento de la cara; aumento de la sudoración; supresión de reacciones en las pruebas cutáneas; reacciones tales como inflamación alérgica de la piel, urticaria, hinchazón de la piel.

Neurológicas: convulsiones; aumento de la presión intracraneal (pseudotumor cerebral) comúnmente después del tratamiento; vértigo; dolor de cabeza.

Endocrinas: irregularidades menstruales; desarrollo de un estado cushingoide; disminución del crecimiento intrauterino fetal o infantil; falta de respuesta corticosuprarrenal y pituitaria secundaria, particularmente en situaciones de estrés, tales como traumatismos, cirugía o enfermedad; disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono, manifestaciones de diabetes latente, aumento de los requerimientos de insulina o hipoglucemiantes orales en los diabéticos.

Oftálmicas: cataratas (subcapsular posterior); aumento de la presión intraocular; glaucoma; exoftalmos (ojos saltones); corioretinopatía central serosa (se caracteriza por disminución de la agudeza y del campo visual, habitualmente unilateral y reversible).

Metabólicas: balance de nitrógeno negativo debido al catabolismo proteico (degradación de proteínas).

Psiquiátricas: euforia, oscilaciones de humor; depresión grave a francas manifestaciones psicóticas; cambios de personalidad; hiperirritabilidad; insomnio.

Otras: reacciones de hipersensibilidad y reacciones hipotensivas o similares al shock.

¿Cómo conservar CORTICAS L?

- Conservar en su envase original a temperatura hasta 30°C. Proteger de la humedad.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentaciones

Comprimidos: envase con 10 comprimidos.

Solución Oral: envase con 60 ml.

Si Ud. toma dosis mayores de CORTICAS L de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Fecha de última revisión: Julio de 2025.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234”

Asimismo, puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco S.A.I.C. a través de farmacovigilancia@casasco.com.ar.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli– Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

Certificado N° 55.246

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**