ETHOPIL®

DECUALINIO CLORURO 10 MG *Óvulos*
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
CONSULTE A SU MÉDICO

Venta Bajo Receta Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a utilizar **ETHOPIL** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula
Cada óvulo contiene:
Decualinio cloruro 10,0 mg. Excipiente: glicéridos semisintéticos sólidos.

¿Qué es ETHOPIL y para qué se usa?
El cloruro de decualinio, principio activo de ETHOPIL, pertenece al grupo de antiinfecciosos y antisépticos. El cloruro de decualinio es activo frente a las bacterias que causan vaginosis bacteriana.

ETHOPIL se usa para el tratamiento de la vaginosis bacteriana.
Se inserta en la vagina para realizar el tratamiento en el lugar de la infección.

Antes de usar ETHOPIL
No use* ETHOPIL *si
- Si es alérgica al principio activo cloruro de decualinio o al excipiente.
- Si tiene una ulceración del epitelio vaginal o del cuello del útero.
- Si no ha tenido aún su primera menstruación.

***Tenga especial cuidado con* ETHOPIL**
No se recomienda el uso intravaginal de jabones, espermicidas o lavados vaginales durante el tratamiento con ETHOPIL.

Como en todos los casos de infección vaginal, no se recomienda mantener relaciones sexuales sin protección durante el tratamiento con ETHOPIL.
ETHOPIL no reduce la eficacia de los preservativos de látex.
Este producto puede reducir la eficacia de los preservativos que no sean de látex o los diafragmas. Por lo tanto, se deben usar métodos anticonceptivos alternativos durante al menos las 12 horas siguientes al tratamiento.
No use ETHOPIL durante las 12 horas previas al parto para minimizar la exposición del recién nacido al cloruro de decualinio. Dadas las circunstancias, informe a su médico.
Detenga el tratamiento durante la fase de hemorragia más profusa de la menstruación y reanúdelo a continuación.
Si los síntomas persisten al final del tratamiento o reaparecen posteriormente, consulte a su médico.

Uso simultáneo de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

¿Cómo usar ETHOPIL?
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es 1 ovulo diario por un periodo de 6 días.

Instrucciones de uso
- Use el producto todas las noches antes de irse a dormir.
- Lávese las manos antes de abrir el blíster.
- Túmbese boca arriba con las piernas ligeramente flexionadas. Inserte un óvulo profundamente en la vagina.
- Detenga el tratamiento durante los días de menstruación más profusa, y reanúdelo a continuación.
- No interrumpa el tratamiento antes de tiempo, incluso si ya no tiene molestias (por ej. picor, flujo, olor). Un tratamiento de menos de 6 días puede provocar que sus síntomas reaparezcan.

Si tiene la impresión de que el efecto de ETHOPIL es demasiado fuerte o demasiado débil, consulte a su médico o farmacéutico

Embarazo y Lactancia
Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
Si está en periodo de lactancia o tiene intención de dar el pecho, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
Basado en experiencias previas y puesto que ETHOPIL actúa localmente, no se esperan efectos perjudiciales en el embarazo y/o la salud del feto o del recién nacido durante la lactancia. Se debe usar ETHOPIL únicamente durante el embarazo y durante la lactancia, si fuese necesario desde el punto de vista médico.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Uso en niños y adolescentes
No se dispone de experiencia suficiente del uso de ETHOPIL en niños y adolescentes menores de 18 años.

Mujeres mayores de 55 años
No se dispone de experiencia suficiente del uso de ETHOPIL en mujeres mayores de 55 años.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos y uso de maquinaria
No es probable que ETHOPIL afecte a su capacidad de conducir o utilizar alguna maquinaria. No se han realizado estudios.

Uso apropiado del medicamento ETHOPIL
***Si se olvidó de aplicar* ETHOPIL**
No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con ETHOPIL
Si el tratamiento dura menos de 6 días puede ocurrir una recaída. Por tanto, no interrumpa el tratamiento prematuramente, ni siquiera si ya no nota ningún malestar (como picor, flujo u olor).

A tener en cuenta mientras se aplica ETHOPIL

Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. La mayoría de ellos son leves y transitorios.

A veces los síntomas de las infecciones vaginales (tales como prurito, ardor y flujo) pueden empeorar al inicio del tratamiento, antes de que empiecen a mejorar. En estos casos, debe continuar con el tratamiento, pero si las molestias persisten, consulte a su médico tan pronto como sea posible.

Frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Flujo vaginal; prurito o ardor vaginal;
- Infección por levaduras (candidiasis vaginal)

Poco frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Sangrado vaginal;
- Dolor vaginal
- Inflamación de la vagina (vaginitis) y de la vulva
- Vaginosis bacteriana
- Infecciones fúngicas de la piel
- Dolor de cabeza;
- Náuseas;

Frecuencia no conocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles)

- Ulceraciones de la mucosa vaginal si estaba dañada antes del tratamiento;
- Sangrado uterino;
- Enrojecimiento, sequedad vaginal;
- Inflamación de la vagina (cistitis);
- Reacción alérgica con síntomas como erupción, inflamación o picor;
- Fiebre.

¿Cómo conservar ETHOPIL?

- Conservar en su envase original en lugar seco, a temperatura ambiente hasta 25°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 6 óvulos.

Fecha de última revisión: septiembre de 2024.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten. 

Si Ud. utiliza dosis mayores de* ETHOPIL *de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas.
Ante cualquier inconveniente con el producto puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

Asimismo, puede comunicarse con el Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Casasco S.A.I.C. a través de farmacovigilancia@casasco.com.ar.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.
Certificado N° 60.233
Laboratorios CASASCO S.A.I.C.
Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

CASASCO