

## BENCIDAMINA CETILPIRIDINIO

VENTA BAJO RECETA  
INDUSTRIA ARGENTINA

### Fórmula

Cada 100 ml contiene: bencidamina clorhidrato 150,00 mg; cloruro de cetilpiridinio 50,00 mg. Excipientes: alcohol 8,100 g; glicerina 5,000 g; aceite de ricino hidrogenado polioxitileno derivado 1,200 g; sacarina sódica 0,050 g; aroma menta 0,030 mg; bicarbonato de sodio 18,30 mg; amarillo de quinolina 2,00 mg; azul patente 0,33 mg; ácido clorhídrico c.s.p. pH 5,0 - 6,5; agua purificada c.s.p. 100,00 ml.

**Acción Terapéutica:** antiinflamatorio y antiséptico de uso tópico.

**Indicaciones:** tratamiento sintomático de las estomatitis, gingivitis y faringitis.

**Acción Farmacológica:** el Clorhidrato de Bencidamina es un antiinflamatorio no esteroide perteneciente a la clase de los indazoles que actúa inhibiendo la acción inflamatoria de histamina y serotonina y disminuyendo la liberación de radicales libres y enzimas líticas por las células inflamatorias.

El Cloruro de Cetilpiridinio es un antiséptico catiónico perteneciente a la clase de los amonios cuaternarios.

**Farmacocinética:** con el uso tópico del ERNEX DUO, la absorción sistémica de los productos activos es virtualmente nula.

**Posología y Modo de administración:** efectuar buches y/o gárgaras con 15 ml de la solución 2-3 veces al día, con una duración máxima recomendada de 5 a 7 días.

**Contraindicaciones:** hipersensibilidad a alguno de los principios activos.

**Advertencias:** el tratamiento con este producto no debe excluir el tratamiento etiológico en caso de ser necesario.

**Precauciones:** el uso de ERNEX DUO, sobre todo en forma prolongada puede producir fenómenos de sensibilización en orofaringe.

**Embarazo y Lactancia:** no existiendo evidencias clínicas del uso de este producto durante el embarazo y la lactancia, deberá utilizarse en esta situación tras la evaluación del costo / beneficio por parte del médico tratante.

**Interacciones medicamentosas:** no se han descrito.

**Reacciones adversas:** el uso de Bencidamina en forma tópica puede provocar una ligera sensación de adormecimiento en la boca, asociada a la actividad anestésica local. El uso del cetilpiridinio puede provocar sensación de quemazón o irritación locales en forma leve y transitoria.

**Sobredosificación:** no se han verificado fenómenos de sobredosificación con el uso tópico de Bencidamina y Cetilpiridinio. La sobredosis de Bencidamina por vía sistémica se acompaña de excitación, sudoración, ataxia, temblores, vómitos y convulsiones, siendo el tratamiento puramente sintomático. La sobredosis por ingesta de cantidades importantes de compuestos amonio cuaternarios, como el Cetilpiridinio, se caracteriza por presentar náuseas, vómitos, disnea, depresión del Sistema Nervioso

1

Central, hipotensión y coma, siendo el tratamiento sintomático.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

**ADVERTENCIA:** contiene 8,10% peso / volumen de alcohol etílico/etanol. No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con disulfiram.

**Presentación:** frascos de 120 ml.

Fecha de última revisión: agosto de 2013.

### Forma de conservación

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.

- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.

Certificado N° 53.339

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bajo licencia Angelini Francesco S.P.A., Roma – Italia.