

## AMINOACIDOS VITAMINA B12

Venta Bajo Receta  
Industria Argentina

### Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene:

Glutamina 150,00 mg; fosfotreonina 40,00 mg; L-Triptofano 100,00 mg; fosfoferina 120,00 mg; arginina clorhidrato 300,00 mg; cianocobalamina 1,00 mg.

Excipientes: povidona 20,00 mg; hidroxipropilmetilcelulosa .21,30 mg; celulosa microcristalina 119,93 mg; croscarmelosa sódica 8,00 mg; estearato de magnesio 22,93 mg; polimetacrilato 13,41 mg; polietilenglicol 6000 2,15 mg; punzó 4R laca aluminica 0,66 mg; dióxido de titanio 2,64 mg; talco 13,41 mg; sacarina sódica 0,47 mg.

### Acción Terapéutica: reconstituyente general.

Los aminoácidos que integran la fórmula de Polper B12 Forte participan en el metabolismo intermedio; son precursores de neurotransmisores (serotonina, ácido glutámico, GABA, acetilcolina) y de moléculas metabólicamente activas.

La vitamina B12 es co-factor indispensable en el Sistema Nervioso y Hematopoyético. Participa en la síntesis de proteínas de ácidos nucleicos, de mielina y en reacciones de transmetilación. Se ha descrito como relativamente frecuente su carencia subclínica en pacientes ancianos, así como un síndrome demencial específico por déficit de esta vitamina.

**Indicaciones:** astenia física y psíquica. Disminución del rendimiento intelectual y memoria. Convalecencia post-quirúrgica y post-infecciosa. Sobreactividad física y psíquica. Síndrome depresivo.

**Posología:** un comprimido recubierto por día.

Se aconseja tratamientos mínimos de 15 días continuados.

Debido a la ausencia de efectos colaterales este tratamiento puede prolongarse el tiempo que el médico considere necesario.

**Precauciones y advertencias:** como todo medicamento su empleo en el primer trimestre del embarazo debe realizarse una vez evaluada la adecuada relación riesgo-beneficio. Hasta el momento no se han descrito efectos perjudiciales sobre el feto o sobre el curso del embarazo.

Las medicaciones que contienen L-triptofano han provocado en algunos casos síndrome de eosinofilia-mialgia. La posible interacción entre el L-triptofano y los inhibidores de la recaptación de serotonina puede producir un síndrome serotoninérgico caracterizado por la combinación de excitación y síntomas gastrointestinales incluyendo diarrea. Las combinaciones de este producto con inhibidores de la recaptación de serotonina deben realizarse con precaución.

La administración de L-triptofano puede en raros casos producir somnolencia por lo cual debe advertirse a aquellos pacientes que operen maquinarias o conduzcan automóviles.

Interacciones medicamentosas: la combinación con inhibidores de la recaptación de la serotonina podría desencadenar síndrome serotoninérgico (Ver Precauciones).

**Acciones colaterales y secundarias:** no se han descrito efectos adversos específicos.

**Antagonismos y antidotismos:** no posee.

**Contraindicaciones:** hipersensibilidad a algunos de los excipientes de la formulación.

1

**Presentación:** Envases conteniendo 10 y 30 comprimidos recubiertos.

Fecha de última revisión: agosto de 2007

### Forma de conservación

- Conservar en lugar fresco y seco. Preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD.

Bajo licencia Sigma-Tau Roma – Italia.

Certificado N° 33.519

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Boyacá 237 - Buenos Aires

E-0114-04 | D0421 | Act.06/2011